



Acetylcystein intravenös inf 18 mg/mL

Acetylcystein lösning för nebulisator, används intravenöst.

EN-STEGSSPÄDNING

Acetylcystein		NaCl 9 mg/mL alt		INF
200 mg/mL	+	Glukos 50 mg/mL	=	18 mg/mL
10 mL		100 mL		110 mL

ADMINISTRERING

Intravenös infusion: 20 min, med start 30 min före andningsgymnastik

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

Acetylcystein (registrerad produkt)

200 mg/mL, Lösning för nebulisator

Öppnad injektionsflaska förvaras i rumstemperatur. Bruten förpackning får ej sparas.

18 mg/mL, Infusionsvätska, lösning

Hållbar 24 tim i kylskåp, 12 tim i rumstemperatur.

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Slemlösande vid cystisk fibros (låg evidens)

Kan ges innan andningsgymnastik då oral slemlösande behandling inte har tillräcklig effekt.

Barn 10 - 18 år: 110 mL x 1 - 2

ÖVRIG INFORMATION

Intravenös behandling med slemlösande läkemedel bör undvikas till nydiagnostiserade patienter. Invänta och utvärdera först effekten av oral behandling, då alltför löst slem kan vara svårt för patienten att hantera.

REFERENS/LÄNK

Rekommendation , (Grade 2D)

<https://www.gradeworkinggroup.org/>

LOKAL LÄNK

Lokal instruktion, begränsad åtkomst

http://eped.sll.sjunet.org/eped_extra/lokalreferens.html#2938

EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Ingehla Rydén

ePedID: 2938

Fastställare/läkare: Christiane Garnemark

Versionsnummer, major: 1

Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt

Giltig fr o m: 2025-03-04

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT