



## Acetylcystein intravenös inf 18 mg/mL

### INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

Spädning från koncentrat till infusionsvätska, lösning 200 mg/mL, alternativt  
Spädning från lösning för nebulisator 200 mg/mL, används INTRAVENÖST

### EN-STEGSSPÄDNING

Acetylcystein		NaCl 9 mg/mL alt		INF
200 mg/mL	+	Glukos 50 mg/mL	=	<b>18 mg/mL</b>
10 mL		100 mL		110 mL

### ADMINISTRERING

Intravenös infusion: 20 min, med start 30 min före andningsgymnastik

### HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

#### Acetylcystein (registrerad produkt)

200 mg/mL, Lösning för nebulisator, anv. INTRAVENÖST

Oöppnad injektionsflaska förvaras i rumstemperatur. Bruten förpackning får ej sparas. Gäller även koncentrat till infusionsvätska.

18 mg/mL, Infusionsvätska, lösning

Hållbar 24 tim i kylskåp, 12 tim i rumstemperatur.

### VANLIG INDIKATION OCH DOS

#### Slemlösande vid cystisk fibros (låg evidens)

Kan ges innan andningsgymnastik då oral slemlösande behandling inte har tillräcklig effekt.

Barn 10 - 18 år: 110 mL x 1 - 2

### ÖVRIG INFORMATION

Intravenös behandling med slemlösande läkemedel bör undvikas till nydiagnostiserade patienter. Invänta och utvärdera först effekten av oral behandling, då alltför löst slem kan vara svårt för patienten att hantera.

### REFERENS/LÄNK

Rekommendation , (Grade 2D)

<https://www.gradeworkinggroup.org/>

### LOKAL LÄNK

Lokal instruktion, begränsad åtkomst

[http://eped.sll.sjunet.org/eped\\_extra/lokalreferens.html#2938](http://eped.sll.sjunet.org/eped_extra/lokalreferens.html#2938)

### EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Ingehla Rydén

ePedID: 2938

Fastställare/läkare: Christiane Garnemark

Versionsnummer, major: 1

Lokal kontakt: [www.eped.se/kontakt](http://www.eped.se/kontakt)

Giltig fr o m: 2026-02-17

**KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT**