



Oseltamivir oralt

(ex Tamiflu) kapslar

INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

Kapslar 30, 45 och 75 mg (Tamiflu, Ebilfumin)

Oseltamivir finns även som oral suspension 6 mg/mL, se annan instruktion.

ADMINISTRERINGSSÄTT

Oralt:

Barn som inte kan svälja kapslar bör i första hand använda oseltamivir oral suspension. Kapslarna kan dock öppnas och innehållet blandas i maximalt 1 tesked lämpligt sötat livsmedel (för att dölja den bittra smaken). Kapseln öppnas genom att hålla den upprätt, knacka ner pulvret i botten och klippa av toppen. Blandningen ska röras om och hela mängden ska ges till patienten.

Enteralt i sond:

Kapseln öppnas genom att hålla den upprätt, knacka ner pulvret i botten och klippa av toppen. Blanda innehållet med 5 mL vatten och administrera. Skölj efter med ytterligare 5 mL vatten för att få med kvarvarande läkemedel.

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

Oseltamivir (registrerad produkt)

75 mg, Kapsel, hård

HÅLLBAR: Förvaras vid högst 25 °C. Gäller alla styrkor.

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Observera att behandling med oseltamivir inte är en ersättning för influensavaccination.

Behandling av influensa (känsliga influensastammar)

Nyfödda (fullgångna): 3 mg/kg x 2 (använd oral suspension)

Barn 1 - 12 mån: 3 mg/kg x 2 (använd oral suspension)

Barn 1 - 18 år:

Barn 10 - 15 kg: 30 mg x 2

Barn 16 - 23 kg: 45 mg x 2

Barn 24 - 40 kg: 60 mg x 2

Barn över 40 kg: 75 mg x 2

Behandlingstid: 5 dagar

Vid nedsatt njurfunktion överväg dosering 1 gång dagligen.

Profylax mot influensa

Nyfödda (fullgångna): 3 mg/kg x 1 (använd oral suspension)

Barn 1 - 12 mån: 3 mg/kg x 1 (använd oral suspension)

Barn 1 - 18 år:

Barn 10 - 15 kg: 30 mg x 1

Barn 16 - 23 kg: 45 mg x 1

Barn 24 - 40 kg: 60 mg x 1

Barn över 40 kg: 75 mg x 1

Behandlingstid: 10 dagar





Osetamivir oralt

(ex Tamiflu) kapslar

ÖVRIG INFORMATION

Tveksam behandlingseffekt under den första levnadsmånaden pga nyfödda barns omogna leverenzym. Osetamivir är en pro-drug som måste metaboliseras till osetamivirkarboxylat för att ha effekt.

Effekt har visats då behandlingen inletts inom två dagar efter att symtomen först uppträtt.

REFERENS/LÄNK

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Läkemedelsverket Behandlingsrekommendation - Behandling och profylax av influensa med antivirala medel

<https://lv.se/influensaprofylax>

Rekommendation , (Grade 2B)

http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade

EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Ingehla Rydén 2019-10-03

ePedID: 2971

Fastställare/läkare: Charlotte Höglund 2019-10-03

Versionsnummer, major: 4

Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt

Giltig fr o m: 2019-10-03

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT