



## Oseltamivir oralt

(ex Tamiflu) kapslar

### INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

Kapslar 30, 45 och 75 mg (Tamiflu, Ebilfumin)

Oseltamivir finns även som oral suspension 6 mg/mL, se annan instruktion.

### ADMINISTRERING

Oralt:

Barn som inte kan svälja kapslar bör i första hand använda oseltamivir oral suspension. Kapslarna kan dock öppnas och innehållet blandas i maximalt 1 tesked lämpligt sötat livsmedel (för att dölja den bittra smaken). Kapseln öppnas genom att hålla den upprätt, knacka ner pulvret i botten och klippa av toppen. Blandningen ska röras om och hela mängden ska ges till patienten.

Tänk på att arbeta på ett sådant sätt att exponeringsrisken för damm minimeras, pulvret kan irritera hud och ögon.

Enteralt:

Kapseln öppnas genom att hålla den upprätt, knacka ner pulvret i botten och klippa av toppen. Blanda innehållet med 5 mL vatten och administrera. Skölj efter med ytterligare 5 mL vatten för att få med kvarvarande läkemedel.

Tänk på att arbeta på ett sådant sätt att exponeringsrisken för damm minimeras, pulvret kan irritera hud och ögon.

### HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

#### Oseltamivir (registrerad produkt)

Kapsel, hård

Förvaras vid högst 25 °C. Gäller alla styrkor.

### VANLIG INDIKATION OCH DOS

Observera att behandling med oseltamivir inte är en ersättning för influensavaccination.

För doser under 30 mg rekommenderas användning av oral suspension, se annan instruktion.

#### Behandling av influensa (känsliga influensastammar)

Nyfödda (fullgångna): 3 mg/kg x 2

Barn 1 - 11 mån: 3 mg/kg x 2

Barn 1 - 18 år:

10 - 15 kg: 30 mg x 2

16 - 23 kg: 45 mg x 2

24 - 40 kg: 60 mg x 2

Över 40 kg: 75 mg x 2

Behandlingstid: 5 dagar, för immunsupprimerade 10 dagar

Vid nedsatt njurfunktion kan dosjustering vara nödvändig.

#### Profylax mot influensa efter exponering

Nyfödda (fullgångna): 3 mg/kg x 1

Barn 1 - 11 mån: 3 mg/kg x 1

Barn 1 - 18 år:

10 - 15 kg: 30 mg x 1

16 - 23 kg: 45 mg x 1

24 - 40 kg: 60 mg x 1

Över 40 kg: 75 mg x 1

Behandlingstid: 10 dagar





## Osetamivir oralt

(ex Tamiflu) kapslar

### ÖVRIG INFORMATION

Tveksam behandlingseffekt under den första levnadsmånaden pga nyfödda barns omogna leverenzym. Osetamivir är en pro-drug som måste metaboliseras till osetamivirkarboxylat för att ha effekt.

Effekt har visats då behandlingen inletts inom två dagar efter att symtomen först uppträtt.

### REFERENS/LÄNK

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Läkemedelsverket Behandlingsrekommendationer, Behandling och profylax vid influensa

<https://www.lakemedelsverket.se/sv/behandling-och-forskrivning/behandlingsrekommendationer/sok-behandlingsrekommendationer?q=influensa>

PubMed PMID J-W Liu et al. Comparison of antiviral agents for seasonal influenza outcomes in healthy adults and children.

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34387680>

Rekommendation , (Grade 2B)

<https://www.gradeworkinggroup.org/>

---

### EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Ingehla Rydén

ePedID: 2971

Fastställare/läkare: Christiane Garnemark

Versionsnummer, major: 4

Lokal kontakt: [www.eped.se/kontakt](http://www.eped.se/kontakt)

Giltig fr o m: 2025-02-04

**KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT**