



Oxibutynin intravesikal instillation 0,5 mg/mL

(Oxybutynin Unimedic)

ADMINISTRERING

IntraveSIKAL instillation:

Vid urininkontinens:

Efter tömning av urinblåsan genom ren intermitterent katetrisering (RIK) sprutas oxybutyninlösningen in i blåsan medan katetern ännu sitter på plats. Efter administrering av oxibutynindosen sprutas antingen NaCl 9 mg/mL eller luft in i katetern för att säkerställa att dosen når urinblåsan. Därefter avlägsnas katetern. Tömning av urinblåsan sker vid nästa RIK-tillfälle, dock senast efter 4 timmar.

Vid blåskrämp:

Ordinerad dos blandas med NaCl 9 mg/mL till ca 10 mL och därefter sprutas läkemedlet in i urinblåsan via katetern.

Stäng katetern under 15 - 20 min och öppna den därefter.

RIMLIG DOS för Oxibutynin intravesikal instillation 0,5 mg/mL

	1 kg	5 kg	10 kg	50 kg
0,1 mg/kg	-	1 mL	2 mL	10 mL
0,15 mg/kg, max 5 mg	-	1,5 mL	3 mL	10 mL
0,5 mg	-	1 mL	-	-
1 mg	-	-	2 mL	-

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

Oxibutynin (registrerad produkt)

0,5 mg/mL, Lösning för intravesikal användning

Förvaras vid högst 25 °C. Hållbarhet öppnad förpackning 24 tim kylskåp, 12 tim rumstemp.

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Urininkontinens på grund av neurogen blåsrubbning, ofta försäskad av ryggmärgsbräck

Individuell dosering som också är åldersberoende.

Vanlig startdos: 0,1 mg/kg x 2

Kan höjas till 0,15 mg/kg, max 5 mg/DOS.

Instilleras vid första och sista RIK-tillfället. Kvällsdosen kan i vissa fall vara något större än morgondosen.

Blåskrämp postoperativt p.g.a. kvarliggande kateter i urinblåsan exempelvis efter hypospadioperation

Barn mindre än 10 kg: 0,5 mg

Barn från 10 kg: 1 mg

Dosen ska spädas till ca 10 mL med NaCl 9 mg/mL innan administrering för enklare hantering.

REFERENS/LÄNK

BNF-C

<http://www.medicinescomplete.com/mc/bnfc/current/>

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Internetadress Svensk Urologisk förening Störningar av de nedre urinvägarnas funktioner, State of the Art 2015

https://urologi.org/wp-content/uploads/2016/12/Sota_NU_funktion_150629.pdf

Rekommendation , (Grade 2C)

<https://www.gradeworkinggroup.org/>

EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Åsa Andersson

ePedID: 2977

Fastställare/läkare: Christiane Garnemark

Versionsnummer, major: 3

Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt

Giltig fr o m: 2025-11-21

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT