

## ATRACURIUM-HAMELN, IV inf

atrakurium 5 mg/ml

enl spädn-instruktion

|                   |   |              |               |
|-------------------|---|--------------|---------------|
| <i>inj vätska</i> |   |              | <i>IV inf</i> |
| 10 mg/ml          |   | NaCl 9 mg/ml | 5 mg/ml       |
| 2 ml              | + | 2 ml         | = 4 ml        |

Administrering: Kontin inf

Hållbarhet efter iordningställande: 12 tim rt, 24 tim kyl. 8 tim rt om blandning i glukos 50 mg/ml.  
Hållbarhet originalförp: Överbliven vätska i öppnade ampuller ska kasseras.

Varunummer: 8082, Atracurium hameln inj 10mg/ml, 5 x 5 ml

Källa: FASS

Indikation: Muskelrelaxation vid kirurgiska ingrepp samt vid intensivvård

Vanlig dos: Atrakuriumbesylat rekommenderas inte till nyfödda eftersom data är ofullständiga. Om neuromuskulär blockad är absolut nödvändig, bör dosen hos nyfödda eller prematurer betydligt reduceras. Dos till nyfödda: 0,3-0,4 mg/kg/tim.

| Vanlig dos    | Vanlig dos omräknad till volym beroende på kroppsvikt för atrakurium 5 mg/ml |             |             |             |
|---------------|--|-------------|-------------|-------------|
|               | 0,5 kg   | 1 kg        | 2 kg        | 3 kg        |
| 0,3 mg/kg/tim | 0,03 ml/tim  | 0,06 ml/tim | 0,12 ml/tim | 0,18 ml/tim |
| 0,4 mg/kg/tim | 0,04 ml/tim  | 0,08 ml/tim | 0,16 ml/tim | 0,24 ml/tim |