



Parecoxib intravenös inj 20 mg/mL

(Dynastat)

Försiktighet vid nedsatt njur- eller leverfunktion, gastroenterit och långvarig feber.

INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

Förpackning med eller utan medföljande vätska 2 mL.

EN-STEGSSPÄDNING

Dynastat		NaCl 9 mg/mL alt Glukos 50		INJ
40 mg		mg/mL	=	20 mg/mL
1 st	+	2 mL		2 mL

Beredningsinstruktion:

Pulvret kan även lösas upp med medföljande vätska.

Lös upp pulvret fullständigt genom att försiktigt snurra injektionsflaskan.

ADMINISTRERINGSSÄTT

Intravenös injektion

RIMLIG DOS för Parecoxib intravenös inj 20 mg/mL

	1 kg	5 kg	10 kg	50 kg
0,4 mg/kg	-	-	0,2 mL	1 mL
0,5 mg/kg	-	-	0,25 mL	1,25 mL

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

Dynastat (registrerad produkt)

40 mg, Pulver till injektionsvätska, lösning

HÅLLBAR: Förvaras i rumstemperatur.

20 mg/mL, INJEKTIONSVÄTSKA

HÅLLBAR: Hållbar i 12 tim vid högst 25 °C. Får inte kylas eller frysas.

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Smärta, korttidsbehandling (inkl postoperativ smärta)

Barn 1 - 18 år: (0,4 -) 0,5 mg/kg x 1 (- 2), max 80 mg/DYGN

Ibuprofen infusionsvätska kan vara alternativ till mindre barn.

Vid övergång från parecoxib till per oral behandling med NSAID (t.ex. ibuprofen, celecoxib), bör per oral behandling påbörjas 10 - 12 tim efter sista dosen parecoxib.

ÖVRIG INFORMATION

Parecoxib är en selektiv COX-2 hämmare.

Försiktighet vid nedsatt njur- och leverfunktion, gastroenterit, långvarig feber, varicella zosterinfektion, hjärtsvikt och antikoagulationsbehandling. Bör inte administreras samtidigt med andra nefrotoxiska läkemedel.

Selektiva COX-2 hämmare orsakar mindre GI-blödningar än andra NSAID-läkemedel.

REFERENS/LÄNK

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Internetadress ePed - Referenser, Riktlinjer för smärtbehandling vid Astrid Lindgrens Barnsjukhus

<http://eped.se/referenser/>

Internetadress VGR, Alfresco - Tonsillotomi-tonsillektomi barn anestesisirutin

<https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/21036/Tonsillotomi-tonsillektomi%20barn%20anestesisirutin.pdf?a=false&guest=true>

Micromedex

Rekommendation ,(Grade 2C)

http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade



Parecoxib intravenös inj 20 mg/mL (Dynastat)



EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Anna Hardmeier 2020-12-01

ePedID: 3005

Fastställare/läkare: Charlotte Höglund 2020-12-02

Versionsnummer, major: 3

Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt

Giltig fr o m: 2020-12-02

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT