



Erythropoietin subkutan inj 2 000 E/0,3 mL

(NeoRecormon) nyfödda

Stor risk då en insulinspruta måste användas.

INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

1. Utgå ENDAST från Neorecormon 2000 E/0,3 mL.

Beredningsinstruktion:

2. Använd insulinsprutor BD Micro-Fine+ 0,3 mL (0,30mm(30G)x8mm). Dessa är graderade för administrering av Insulin 100 E/mL. Detta innebär att dosen som ska dras upp MÅSTE

ÖVERSÄTTAS enligt nedanstående:

Dos erythropoietin	Märkning på insulinsprutan
66 E = 0,01 mL	1 E
132 E = 0,02 mL	2 E
198 E = 0,03 mL	3 E
264 E = 0,04 mL	4 E
330 E = 0,05 mL	5 E
660 E = 0,10 mL	10 E
1320 E = 0,20 mL	20 E
1980 E = 0,30 mL	30 E

3. Ta bort gummi-hatten på Neorecormon-sprutan (2000E/0,3 mL) och för över endast den ordinerade volymen till "insulinsprutan". Ta bort eventuell luft.

ADMINISTRERINGSSÄTT

Subkutan injektion

ÖVRIG INFORMATION

Företaget rekommenderar inte att man använder en annan spruta, men det är inte praktiskt genomförbart att administrera från den medföljande förfyllda sprutan.

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

Neorecormon (registrerad produkt)

2000 E/0,3 mL, Injektionsvätska, lösning, förfylld spruta

HÅLLBAR: Öppnad förvaras i kylskåp annars 3 dagar i rumstemperatur.

Öppnad spruta ska användas omedelbart. Ljuskänsligt.

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Anemiprofylax hos prematurfödda barn

250 E/kg ges 3 (- 5) ggr/vecka.

Behandlingstid: vanligen 6 veckor

REFERENS/LÄNK

BNF-C

<http://www.medicinescomplete.com/mc/bnfc/current/>

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Rekommendation (Grade 1D)

http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade

EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Åsa Andersson 2018-10-24

ePedID: 3009

Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2018-10-24

Versionsnummer, major: 2

Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt

Giltig fr o m: 2018-10-24

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT