



Adrenalin inj 0,1 mg/mL = 100 mikrog/mL

flera administreringsvägar

Om hjärtstilleståndet misstänks ha utlösts av boffning bör adrenalin INTE användas i samband med hjärt-lungräddning, se Vanlig indikation och dos.

INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

Alt. 1: Adrenalin 0,1 mg/mL. Bör användas i första hand (ex Adrenalin Martindale)

Alt. 2: Spädning från 1 mg/mL (ex Adrenalin Bradex)

Alt. 3: Adrenalin lösning i förfylld spruta 0,1 mg/mL, 10 mL (Adrenalin Aguettant)

0,1 mg/mL = 100 mikrog/mL

INGEN SPÄDNING

Alt. 1 och 3

INJ LÖ
0,1 mg/mL
10 mL

EN-STEGSSPÄDNING

Alt. 2

Adrenalin 1 mg/mL 1 mL	+	NaCl 9 mg/mL alt Glukos 50 mg/mL 9 mL	=	INJ LÖ 0,1 mg/mL 10 mL
------------------------------	---	---	---	------------------------------

ARBETSMILJÖ

Undvik direktkontakt med produkten. Stänk på huden och i ögonen kan ge sveda, rodnad och klåda.

ADMINISTRERING

Intravenös injektion

Intraosseöst

RIMLIG DOS för Adrenalin inj 0,1 mg/mL = 100 mikrog/mL

	1 kg	5 kg	10 kg	50 kg
10 mikrog/kg	0,1 mL	0,5 mL	1 mL	5 mL
30 mikrog/kg	0,3 mL	1,5 mL	-	-

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Adrenalin är det enda läkemedel som visats ha effekt vid hjärtstillestånd.

Obs! Om hjärtstilleståndet misstänks ha utlösts av boffning (berusning genom inhalation av drivgas från vissa sprayprodukter eller gaständare) bör adrenalin INTE användas i samband med hjärt-lungräddning, se Referens.

Behandling under pågående HLR enligt schema NYFÖDDA

Cirkulationssvikt, bradykardi, laryngospasm, bronkospasm:

Nyfödda: 10 - 30 mikrog/kg intravenöst (0,1 - 0,3 mL/kg)

Dosen kan upprepas var 3:e - 5:e min.

Behandling under pågående HLR enligt schema BARN

Asystoli, pulslös elektrisk aktivitet (PEA), cirkulationssvikt:

Barn 1 mån - 18 år: 10 mikrog/kg intravenöst/intraosseöst (0,1 mL/kg)

Dosen kan upprepas var 4:e min.

Ventrikelflimmer, pulslös ventrikeltakykardi:

Barn 1 mån - 18 år: 10 mikrog/kg intravenöst/intraosseöst (0,1 mL/kg)

Ges efter tredje defibrilleringen

Dosen kan upprepas var 4:e min.

Anafylaxi: Vid fortsatt blodtrycksfall/chock (i samråd med narkos)

Barn: 5 - 10 mikrog/kg intravenöst/intraosseöst (0,05 - 0,1 mL/kg)

Max 300 mikrog/DOS (3 mL/DOS)

Dosen kan upprepas var 3:e - 5:e min vid fortsatt cirkulationssvikt, alternativt överväg kontinuerlig adrenalininfusion.





Adrenalin inj 0,1 mg/mL = 100 mikrog/mL

flera administreringsvägar

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

Adrenalin (registrerad produkt)

1 mg/mL, Injektionsvätska, lösning

Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt. Bruten ampull får ej sparas, används direkt. Adrenalin Viatris ska förvaras i kylskåp, dock hållbar 12 mån i högst 25 °C. Övriga tillverkare ska förvaras i högst 25 °C.

0,1 mg/mL, Injektionsvätska, lösning

Förvaras i högst 25 °C. Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt. Bruten ampull får ej sparas, används direkt.

0,1 mg/mL, Injektionsvätska, lösning

Efter iordningställande: 24 tim i kylskåp, 12 tim i rumstemp. Annan hållbarhet anges för Adrenalin Bradex, se Övrig information.

0,1 mg/mL, Injektionsvätska, lösning i förfylld spruta/cylinderampull

Förvaras i högst 25 °C. Får ej frysas. Förvaras i aluminiumpåsen, ljuskänsligt. Används omedelbart efter att aluminiumpåsen och blisterförpackning öppnats.

ÖVRIG INFORMATION

Annan hållbarhet efter spädning anges i produktresumén för Adrenalin Bradex, men utifrån farmaceutisk bedömning i andra källor har vi valt att ha samma hållbarhet för alla tillverkare.

REFERENS/LÄNK

BNF-C

<http://www.medicinescomplete.com/mc/bnfc/current/>

Internetadress Giftinformationscentralen - Drivgas

<https://giftinformation.se/lakare/substanser/drivgas/>

Internetadress HLR-rådet - Avancerad hjärt-lungräddning Barn, Handlingsplan

<https://hlrwebbutik.se/produkt-kategori/barn-a-hlr/>

Internetadress Neonatal HLR - Flödesschema

www.neohlrutbildning.se

Rekommendation , (Grade 1B)

<https://www.gradeworkinggroup.org/>

Svenska Barnläkarföreningen Delföreningen för allergi och lungmedicin - Riktlinjer Anafylaxi - Länk till Nationellt Vårdprogram Anafylaxi, SFFA (Svensk Förening för Allergologi)

<https://aol.barnlakarforeningen.se/riktlinjer/riktlinjer-allergi/>

EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Åsa Andersson

ePedID: 3030

Fastställare/läkare: Christiane Garnemark

Versionsnummer, major: 6

Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt

Giltig fr o m: 2025-02-25

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT