



Pankreatin, multienzym oralt

(ex Kreon für Kinder licens) granulat

INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

Granulat (Creon Micro licens, Kreon für Kinder licens, Creon granulaat 5000)

1 dosmått = 0,1 gram = 5 000 E

Pankreatin = pankreasenzym med proteas-, amylas- och lipasaktivitet.

Styrkeangivelsen avser lipas.

I produktresumén m. fl. ställen benämns substansen pankreaspulver, men det är viktigt att observera att beredningsformen är granulatkorn som inte får krossas eller tuggas.

För information om Administrering, se nästa sida.

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Enzymsubstitution vid exokrin pankreasinsufficiens med eller utan cystisk fibros

Doseringen är individuell och anpassas efter sjukdomens allvarlighetsgrad och kostens sammansättning.

Viktbaserad dosering bör starta med:

Barn under 4 år: 1 000 E lipas/kg/måltid

Barn från 4 år: 500 E lipas/kg/måltid

Efter start med enzymsubstitution följs barnets vikt och avföringsvanor, dosen anpassas därefter till normal avföringsfrekvens och -konsistens för åldern.

De flesta patienter bör inte överstiga 10 000 E lipas/kg/DYGN eller 4 000 E lipas/gram fettintag.

ÖVRIG INFORMATION

Dosmått medföljer förpackningen.

1 dosmått magsaftresistent granulat motsvarar 0,1 gram (100 mg) och innehåller 5000 lipasenheter, 3600 amylasenheter och 200 proteasenheter.





Pankreatin, multienzym oralt

(ex Kreon für Kinder licens) granulat

ADMINISTRERING

Oralt: Tas i samband med måltid.

De magsaftresistenta granulatkornen måste sväljas hela, får ej tuggas eller krossas, då de i så fall kan ge frätskador på slemhinnan. Kornen kan dock blandas med sur vätska/mat t. ex. äppelmos eller apelsinjuice (pH under 5,5) alternativt ges på en sked med lite mjölk. Får inte blandas med varm dryck eller mat, då värme inaktiverar enzymerna.

Säkerställ tillräckligt vätskeintag efter administrering så att inga granulatkorn ligger kvar då dessa kan skada slemhinnan. Kontrollera munhålan regelbundet.

Enteralt: beroende på var sonden mynnar och vilken diameter den har kan följande hantering vara möjlig:

Gastriskt: Enterodrageringen på kornen får INTE förstöras. Kornen kan blandas med lite tjockflytande sur vätska (ej vatten för då är risken för stopp stor) och administreras i sond, 12 Fr och större.

Duodenalt eller jejunalt: Kornen kan antingen krossas och blandas med natriumbikarbonatlösning alt. lösas upp i natriumbikarbonatlösning och sedan administreras.

Rekommenderad mängd ca 10 mL natriumbikarbonatlösning per 10 000 lipasenheter.

Natriumbikarbonatlösning kan göras på följande sätt: 1,5 gram natriumbikarbonat (1,5 st å 1 gram tablett) löses i 20 mL vatten. Alternativt kan infusionslösning användas.

Skölj noga med vatten både före och efter administreringen.

Biologiskt läkemedel. Enligt författning HSLF-FS 2017:37 ange batchnummer i journalhandling.

RIMLIG DOS för Pankreatin, multienzym oralt

	1 kg	5 kg	10 kg	50 kg
500 E lipas/kg	-	-	-	5 dosmått
1000 E lipas/kg	0,2 dosmått	1 dosmått	2 dosmått	-

REFERENS/LÄNK

BNF-C

<http://www.medicinescomplete.com/mc/bnfc/current/>

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Internetadress Karolinska institutet - Svensk Mesh - pancreatin

<https://mesh.kib.ki.se/term/D010194/pancreatin>

Internetadress Medicines for children Leaflet information Pancreatin

<https://www.medicinesforchildren.org.uk/medicines/pancreatin-for-pancreatic-insufficiency/>

Internetadress Produktinformation - Creon Micro

https://www.creon.co.uk/-/media/creoncouk/assets/pdf/uk_pi_creon_021_final.pdf?la=en-gb

Internetadress Produktinformation - Kreon für kinder

<https://www.fachinfo.de/pdf/006265>

Internetadress Region Skåne - Stöd vid läkemedelshantering

<https://www.lakemedelshantering.se/>

Läkemedelsverket Kunskapsstöd, Ordination och hantering av läkemedel via enteral infart eller sond, 2023

<https://www.lakemedelsverket.se/sv/behandling-och-forskrivning/behandlingsrekommendationer/sok-behandlingsrekommendationer/ordination-och-hantering-av-lakemedel-via-enteral-infart-eller-sond>

PubMed PMID Ferrie S et al. Pancreatic Enzyme Supplementation for Patients Receiving Enteral Feeds. Nutr Clin Pract. 2011

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21508176>

PubMed PMID Shlieout G et al. Administration of CREON Pancrelipase Pellets via Gastrostomy Tube is Feasible with No Loss of Gastric Resistance or Lipase Activity. Clin Drug Investig. 2011

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21627335>

Rekommendation , (Grade 1D)

<https://www.gradeworkinggroup.org/>

EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Åsa Andersson

ePedID: 3035

Fastställare/läkare: Christiane Garnemark

Versionsnummer, major: 3

Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt

Giltig fr o m: 2026-04-08

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT





Pankreatin, multienzym oralt

(ex Kreon für Kinder licens) granulat

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

Kreon für kinder (registrerad produkt)

5000 E/dosmått, Granulat

Förvaras vid högst 25 °C. Förvaras i originalförpackningen, fukt känsligt. Öppnad förpackning är hållbar 3 mån. Ev. blandning med vätska eller mat får inte sparas. Gäller även övriga preparat.