



flutikasonPROPIONAT inhalation

(ex Flutide, Icsori)

INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

InhalationsSPRAY 50 mikrog/inh (Flutide Evohaler)
InhalationsSPRAY 125, 250 mikrog/inh (ex Icsori)
InhalationsPULVER 50, 100, 250, 500 mikrog/inh (Flutide Diskus)

Vid rest på inhalationsspray 50 mikrog/inh kan licenspreparat förskrivas (ex Flixotide Junior 50 mikrog/inh).

Läkemedelsverket har gett särskilt tillstånd för receptförskrivning av licenspreparat med flutikasonpropionat 50 mikrog/inh (inhalationsspray) när giltig generell licens finns, se Referens.

ADMINISTRERING

Inhalation: Inhalationsspray används tillsammans med en andningsbehållare (spacer) och vid behov mask. Håll masken tätt över mun och näsa. Så snart barnet klarar av att använda munstycke bör detta användas då det ger bättre utbyte (från ca 3 års ålder).

Barn från 6 år kan i regel använda pulverinhalator. Skölj munnen efter administrering. Vid användning av andningsbehållare (spacer) ska även huden runt näsa och mun rengöras för att undvika lokala biverkningar så som utslag på huden.

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

Flutikasonpropionat (registrerad produkt)

Inhalationsspray, suspension

Förvaras i rumstemperatur. Skyddas mot kyla och direkt solljus. Får ej frysas.
Gäller alla styrkor och alla tillverkare, även licenspreparat.

Inhalationspulver, avdelad dos

Förvaras vid högst 30 °C. Efter att foliepåsen öppnats ska läkemedlet förvaras torrt. Gäller alla styrkor.

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Infektionsutlöst astma (periodisk behandling)

Barn 1 mån - 5 år

Dag 1 - 3: 125 mikrog x 4

Dag 4 - 10: 125 mikrog x 2

Om symtomen har försvunnit inom 1 - 2 dygn kan behandlingen avbrytas.

Vid svåra episoder eller förekomst av obstruktiva besvär oftare än en gång per månad bör kontinuerlig lågdosbehandling ges.

Underhållsbehandling av obstruktiv bronkit/astma

Barn 1 mån - 11 år

Låg dos: 50 mikrog x 1 - 2

Medelhög dos: 50 - 125 mikrog x 2

Hög dos: 125 - 250 mikrog x 2

Barn 12 - 18 år

Låg dos: 50 - 125 mikrog x 2

Medelhög dos: 125 - 250 mikrog x 2

Hög dos: 250 - 500 mikrog x 2

Vid dåligt kontrollerad/svår astma kan dosen höjas till 1000 mikrog x 2, max 2000 mikrog/DYGN.

Vilken dos som används styrs av patientens symtom, se behandlingstrappa i Läkemedelsverkets behandlingsrekommendation Astma hos barn och vuxna (finns som klickbar referens).



flutikasonPROPIONAT inhalation

(ex Flutide, Icsori)



ÖVRIG INFORMATION

FlutikasonPROPIONAT är en inhalationssteroid (ICS) som inte ska förväxlas med flutikasonFUROAT. FlutikasonPROPIONAT 500 mikrog motsvarar ungefär 100 mikrog FlutikasonFUROAT.

Många av doserna ovan är högre än de som är godkända i produktresumén, därför kan det vara bra att ange "Obs" på receptet.

Alla barn som har underhållsbehandling med inhalationssteroid bör längdmätas 1 - 2 ggr per år. Tillväxthastigheten kan påverkas första 1 - 2 åren efter insättning av behandling med inhalationssteroid. Låg till medelhög dos påverkar vanligen inte tillväxten.

REFERENS/LÄNK

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Internetadress Val av spacer vid förskrivning av sprayinhalator (VGR)

<https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/ssn11760-725702066-685/surrogate/Terapir%C3%A5d%20Val%20av%20spacer%20vid%20f%C3%B6rskrivning%20av%20sprayinhalator.pdf>

Läkemedelsverket Behandlingsrekommendationer, Astma hos barn och vuxna

www.lakemedelsverket.se/astma

Läkemedelsverket Särskilt tillstånd att expediera recept på licensläkemedel vid brist

<http://tiny.cc/yfs0101>

PubMed PMID Axelsson I et al. Inhaled corticosteroids in children with persistent asthma: effects of different drugs and delivery devices on growth. Cochrane Database Syst Rev. 2019

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31194879>

PubMed PMID Loke YK et al. Impact of Inhaled Corticosteroids on Growth in Children with Asthma: Systematic Review and Meta-Analysis. PLoS One. 2015

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26191797>

Rekommendation , (Grade 1B)

<https://www.gradeworkinggroup.org/>

Svenska Barnläkarföreningen Delföreningen för allergi och lungmedicin - Riktlinjer Allergi - Astma, underhållsbehandling

<https://aol.barnlakarforeningen.se/riktlinjer/riktlinjer-allergi/>

Svenska Barnläkarföreningen Delföreningen för allergi och lungmedicin - Riktlinjer Allergi och Astma - Val av ICS inhalationsspray till barn 0-5 år

<https://aol.barnlakarforeningen.se/riktlinjer/riktlinjer-allergi/>



flutikasonPROPIONAT inhalation

(ex Flutide, Icsori)



EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Åsa Andersson

ePedID: 3093

Fastställare/läkare: Christiane Garnemark

Versionsnummer, major: 6

Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt

Giltig fr o m: 2026-03-17

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT