



# Flutikason inhalation

(ex Flutide, Icsori)

## INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

Inhalationsspray 50 mikrog/dos (Flutide Evohaler)  
 Inhalationsspray 125, 250 mikrog/dos (ex Icsori)  
 Inhalationspulver 50, 100, 250, 500 mikrog/dos (Flutide Diskus)

Vid rest på inhalationsspray kan licenspreparat förskrivas (ex Flixotide Junior 50 mikrog/dos, Fluticasone Doc 125 mikrog/dos).  
 Läkemedelsverket har gett särskilt tillstånd för receptförskrivning av licenspreparat med flutikason (inhalationsspray) när giltig generell licens finns, se Referens.

Vid restsituation rekommenderas att inhalationsspray flutikason reserveras till barn under 6 år med astma, se Referens LOK.

## ADMINISTRERING

**Inhalation:**  
 Patienten bör skölja munnen med vatten efter varje administrering.

Inhalationsspray används tillsammans med en andningsbehållare (spacer) och vid behov mask. Håll masken tätt över mun och näsa. Så snart barnet klarar av att använda munstycke bör detta användas då det ger bättre utbyte (från ca 3 års ålder).

## HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

### Flutikason (registrerad produkt)

Inhalationsspray, suspension

Förvaras i rumstemperatur. Skyddas mot kyla och direkt solljus. Får ej frysas.  
 Gäller alla styrkor och alla tillverkare, även licenspreparat.

Inhalationspulver, avdelad dos

Förvaras vid högst 30 °C. Efter att foliepåsen öppnats ska läkemedlet förvaras torrt. Gäller alla styrkor.

## VANLIG INDIKATION OCH DOS

Vid rest på inhalationsspray kan licenspreparat förskrivas.  
 Läkemedelsverket har gett särskilt tillstånd för receptförskrivning av licenspreparat med flutikason (inhalationsspray) när giltig generell licens finns, se Referens.

Vid restsituation rekommenderas att inhalationsspray flutikason reserveras till barn under 6 år med astma, se Referens LOK.

### Infektionsutlöst astma (periodisk behandling)

Barn 1 mån - 5 år:  
 Dag 1 - 3: 125 mikrog x 4  
 Dag 4 - 10: 125 mikrog x 2  
 Om symtomen har försvunnit inom 1 - 2 dygn kan behandlingen avbrytas.

Vid svåra episoder eller förekomst mer än en gång per månad bör kontinuerlig lågdosbehandling ges.

### Underhållsbehandling av astma

Barn 1 mån - 11 år:  
 Låg dos: 50 mikrog x 1 - 2  
 Medelhög dos: 50 - 125 mikrog x 2  
 Hög dos: 125 - 250 mikrog x 2

Barn 12 - 18 år:  
 Låg dos: 50 - 125 mikrog x 2  
 Medelhög dos: 125 - 250 mikrog x 2  
 Hög dos: 250 - 500 mikrog x 2  
 Vid dåligt kontrollerad/svår astma kan dosen höjas till 1000 mikrog x 2, max 2000 mikrog/DYGN.

Vilken dos som används styrs av patientens symptom, se behandlingstrappa i Läkemedelsverkets behandlingsrekommendation Astma hos barn och vuxna (finns som klickbar referens).





## Flutikason inhalation

(ex Flutide, Icsori)

### ÖVRIG INFORMATION

Många av doserna ovan är högre än de som är godkända i produktresumén, därför kan det vara bra att ange "Obs" på receptet.

Alla barn som har underhållsbehandling med inhalationssteroid bör längdmätas 1 - 2 ggr per år. Låg till medelhög dos påverkar vanligen inte tillväxten.

### REFERENS/LÄNK

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Internetadress LOK - Nätverk för Sveriges Läkemedelskommittéer. Rekommendation vid brist på inhalationsspray flutikason

<https://samverkanlakemedel.se/natverket-lok/rekommendationer-vid-rester-och-brister-pa-lakemedel/rester-och-brister/2024-11-15-rekommendation-vid-brist-pa-inhalationsspray-flutikason>

Internetadress Val av spacer vid förskrivning av sprayinhalator (VGR)

<https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/ssn11760-725702066-685/surrogate/Terapir%C3%A5d%20Val%20av%20spacer%20vid%20f%C3%B6rskrivning%20av%20sprayinhalator.pdf>

Läkemedelsverket Behandlingsrekommendationer, Astma hos barn och vuxna  
[www.lakemedelsverket.se/astma](http://www.lakemedelsverket.se/astma)

Läkemedelsverket Särskilt tillstånd - flutikasonpropionat

<https://www.lakemedelsverket.se/sv/behandling-och-forskrivning/forskrivning/tillstand-for-utlamnande-vid-generell-licens/flutikasonpropionat--sarskilt-tillstand>

PubMed PMID Cochrane Library Syst Rev 2019 Axelsson I et al: Inhaled corticosteroids in children with persistent asthma: effects of different drugs and delivery devices on growth  
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31194879>

Rekommendation , (Grade 1B)

<https://www.gradeworkinggroup.org/>

Svenska Barnläkarföreningen Delföreningen för allergi och lungmedicin - Riktlinjer Allergi och Astma - Val av ICS inhalationsspray till barn 0-5 år  
<https://aol.barnlakarforeningen.se/riktlinjer/riktlinjer-allergi/>

### EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Åsa Andersson

ePedID: 3093

Fastställare/läkare: Christiane Garnemark

Versionsnummer, major: 6

Lokal kontakt: [www.eped.se/kontakt](http://www.eped.se/kontakt)

Giltig fr o m: 2024-11-19

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT