



Alimemazin oralt 40 mg/mL

(ex Theralen) orala droppar

Bör ej ges till barn under 2 år

ADMINISTRERINGSSÄTT

En droppe med den medföljande pipetten motsvarar ca 1 mg alimemazin. Doser mindre än 1 droppe går ej att administrera.

Alimemazin orala droppar kan i samband med administrering spädas med lämplig dryck, ex. juice eller saft. Bör inte samadministreras med mjölk/mjölksprodukter då ett hjälpämne i dropparna reagerar med mjölk och det bildas en fällning.

Oralt:

Enteralt i sond: Dropparna är trögflytande men kan spädas med lika del vatten före administrering i tunn sond.

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

Theralen (registrerad produkt)

40 mg/mL, Orala droppar, lösning

HÅLLBAR: Förvaras i ytterkartongen, ljuskänsligt. Förvaras i rumstemperatur.

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Endast för kortvarig behandling. Lägsta effektiva dos ska eftersträvas.

Behandling bör inledas och övervakas av specialist i barnpsykiatri.

Sömnrubbing (bör endast användas i undantagsfall)

Barn 2 - 5 år: 2 - 7 mg (2 - 7 droppar)

Barn 6 - 12 år: 5 - 10 mg (5 - 10 droppar)

Dosen ges till natten.

Oro

Barn 2 - 5 år: 3 - 10 mg/DYGN (3 - 10 droppar/DYGN)

Barn 6 - 12 år: 3 - 15 mg/DYGN (3 - 15 droppar/DYGN)

Dygnsdosen bör fördelas på tre doser (morgon, middags- och kvällsdos) där en större deldos ges på kvällen.

Ångest

Barn 12 - 18 år: 10 mg vid behov (10 droppar eller 0,25 mL)

ÖVRIG INFORMATION

Bör ej ges till barn under 2 år pga risk för en uttalad sederande effekt och andningsdepression.

Samtidig behandling med andra neuroleptika bör undvikas.

Alimemazin kan i undantagsfall användas även vid sedering på intensivvårdsavdelning och då förekommer högre doser.

För alimemazin finns godkänd indikation klåda och allergier för barn sedan lång tid tillbaka. Idag finns dock andra antihistaminer med mindre biverkningar och dessa rekommenderas istället för alimemazin. Därför finns inte indikationen klåda med på denna barnläkemedelsinstruktion.



Alimemazin oralt 40 mg/mL

(ex Theralen) orala droppar



REFERENS/LÄNK

Artikel Slørdal L et al. Er alimemazin et egnet søvnmiddel for barn?

<https://tidsskriftet.no/2008/10/legemidler-i-praksis/er-alimemazin-et-egnet-sovnmiddel-barn>

BNF-C

<http://www.medicinescomplete.com/mc/bnfc/current/>

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Läkemedelsverket Behandlingsrekommendationer, Sömnstörningar hos barn och ungdomar

<https://www.lakemedelsverket.se/sv/behandling-och-forskrivning/behandlingsrekommendationer/behandling-av-somnstorningar-hos-barn-och-ungdomar--kunskapsdokument>

PubMed PMID De Bruyne et al. Are antihistamines effective in children? A review of the evidence. 2017

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27335428>

Rekommendation (Grade 2C)

http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade

EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Åsa Andersson 2020-08-24

ePedID: 3104

Fastställare/läkare: Charlotte Höglund 2020-08-24

Versionsnummer, major: 4

Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt

Giltig fr o m: 2020-08-24

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT