



Alimemazin oralt 40 mg/mL

(fd Theralen) orala droppar

Bör ej ges till barn under 2 år

ADMINISTRERING

En droppe med den medföljande pipetten motsvarar ca 1 mg alimemazin. Doser mindre än 1 droppe går ej att administrera.

Alimemazin orala droppar kan i samband med administrering spädas med lämplig dryck, ex. juice eller saft. Bör inte samadministreras med mjölk/mjölksprodukter då ett hjälpmne i dropparna reagerar med mjölk och det bildas en fällning.

Oralt:

Enteralt: Dropparna är trögflytande men kan spädas med lika del vatten före administrering.

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

Alimemazin (registrerad produkt)

40 mg/mL, Orala droppar, lösning

HÅLLBAR: Skiljer sig mellan olika tillverkare. Se förpackningen eller produktresumén.

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Endast för kortvarig behandling. Lägsta effektiva dos ska eftersträvas.

Behandling bör inledas och övervakas av specialist i barnpsykiatri.

Sömnrubbnig (bör endast användas i undantagsfall)

Barn 2 - 5 år: 2 - 7 mg (2 - 7 droppar)

Barn 6 - 12 år: 5 - 10 mg (5 - 10 droppar)

Dosen ges till natten.

Oro (bör endast användas i undantagsfall)

Barn 2 - 5 år: 3 - 10 mg/DYGN (3 - 10 droppar/DYGN)

Barn 6 - 12 år: 3 - 15 mg/DYGN (3 - 15 droppar/DYGN)

Dygnsdosen bör fördelas på tre doser (morgon, middags- och kvälldos) där en större deldos ges på kvällen.

Ångest (bör endast användas i undantagsfall)

Barn 12 - 18 år: 10 mg vid behov (10 droppar eller 0,25 mL). Max 30 mg/DYGN.

ÖVRIG INFORMATION

Bör ej ges till barn under 2 år pga risk för en uttalad sederande effekt och andningsdepression.

Samtidig behandling med andra neuroleptika bör undvikas.

Alimemazin kan i undantagsfall användas även vid sedering på intensivvårdsavdelning och då förekommer högre doser.

För alimemazin orala droppar finns godkänd indikation klåda och allergier för barn sedan lång tid tillbaka. Idag finns dock andra antihistaminer med mindre biverkningar och dessa rekommenderas istället för alimemazin. Därför finns inte indikationen klåda med på denna barnläkemedelsinstruktion.

Alimemazin oralt 40 mg/mL

(fd Theralen) orala droppar



REFERENS/LÄNK

Artikel Slørdal L et al. Er alimemazin et egnet søvnmiddel for barn?

<https://tidsskriftet.no/2008/10/legemidler-i-praksis/er-alimemazin-et-egnet-sovnmiddel-barn>

BNF-C

<http://www.medicinescomplete.com/mc/bnfc/current/>

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Läkemedelsverket Behandlingsrekommendationer, Sömnstörningar hos barn och ungdomar

www.lakemedelsverket.se/somnstorning

PubMed PMID De Bruyne et al. Are antihistamines effective in children? A review of the evidence. 2017

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27335428>

PubMed PMID Holdø I et al, Association between prescribing hypnotics for parents and children in Norway. 2013

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23845695>

Rekommendation , (Grade 2C)

http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade

EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Ellen Norrhäll 2021-05-27

ePedID: 3104

Fastställare/läkare: Charlotte Höglund 2021-06-16

Versionsnummer, major: 5

Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt

Giltig fr o m: 2021-06-16

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT