



Alimemazin oralt 40 mg/mL

(f.d Theralen) orala droppar

Kontraindicerat till barn under 3 år.

ADMINISTRERING

En droppe med den medföljande pipetten motsvarar ca 1 mg alimemazin.

1 droppe = 1 mg = 0,025 mL

Doser mindre än 1 droppe går ej att administrera.

Alimemazin orala droppar kan i samband med administrering spädas med lämplig dryck, ex. juice eller saft. Bör inte samadministreras med mjölk/mjölkprodukter då ett hjälpämne i dropparna reagerar med mjölk och det bildas en fällning.

Oralt

Enteralt: Dropparna är trögflytande men kan spädas med lika del vatten före administrering.

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

Alimemazin (registrerad produkt)

40 mg/mL, Orala droppar, lösning

Orifarm: Förvaras vid högst 30 °C. Ljuskänsligt. Förvaras i originalförpackningen.

Öppnad förpackning är hållbar i 6 månader. Evolan: Förvaras i rumstemperatur.

Öppnad förpackning är hållbar i 3 månader.

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Endast för kortvarig behandling. Lägsta effektiva dos ska eftersträvas pga biverkningsrisk, se Övrig information.

1 droppe = 1 mg = 0,025 mL

Ångest (bör endast användas i undantagsfall)

Behandling bör inledas och övervakas av specialist i barnpsykiatri.

Barn 12 - 18 år: 10 mg vid behov, max 30 mg/DYGN

Oro (bör endast användas i undantagsfall)

Behandling bör inledas och övervakas av specialist i barnpsykiatri.

Barn 3 - 5 år: 2 - 10 mg/DYGN (2 - 10 droppar/DYGN)

Barn 6 - 12 år: 2 - 15 mg/DYGN (2 - 15 droppar/DYGN)

Dygnsdosen bör fördelas på tre doser (morgon, middags- och kvällsdos) där en större deldos ges till kvällen.

Sömnstörning (rekommenderas inte, se Övrig information)

Behandlingen bör hanteras inom barn och ungdomspsykiatri och följas upp noggrant.

Barn 3 - 5 år: 2 - 7 mg (2 - 7 droppar)

Barn 6 - 12 år: 5 - 10 mg (5 - 10 droppar)

Dosen ges till natten.

Klåda och allergi (rekommenderas inte)

För alimemazin finns godkänd indikation klåda och allergier för barn sedan lång tid tillbaka. Idag finns dock andra antihistaminer med mindre biverkningar och dessa rekommenderas istället för alimemazin.

Alimemazin oralt 40 mg/mL

(f.d Theralen) orala droppar



VANLIG INDIKATION OCH DOS

Premedicinering inför procedur (rekommenderas inte)

För alimemazin finns godkänd indikation premedicinering för barn sedan lång tid tillbaka. Idag finns dock andra preparat med färre biverkningar. Alimemazin kan övervägas när andra preparat ej är lämpliga.

ÖVRIG INFORMATION

Bör ej ges till barn under 3 år pga risk för uttalad sederande effekt och andningsdepression.

Vid överdos finns risk för CNS-depression från trötthet till djup medvetslöshet som kan uppträda inom 1-2 timmar. Agitation och icke dosberoende extrapyramidala symtom förekommer.

Samtidigt intag av alkohol och centraldämpande medel förstärker den sedativa effekten och ska därför undvikas.

Samtidig behandling med andra neuroleptika bör undvikas. Särskilt aripiprazol där plasmakoncentrationen av aripiprazol kan öka med 50 % och behöva dosjusteras.

Alimemazin saknar indikation för sömnstörningar hos barn och rekommenderas inte. Den kliniska effekten är begränsad och det finns inte heller något vetenskapligt stöd för behandling av sömnstörning hos barn.



Alimemazin oralt 40 mg/mL

(f.d Theralen) orala droppar



REFERENS/LÄNK

BNF-C

<http://www.medicinescomplete.com/mc/bnfc/current/>

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Internetadress Crediblemeds QT Drugs Lists

<https://www.crediblemeds.org/>

Internetadress Farmakainstruktion 2025 Kunskapsstöd för barn- och ungdomspsykiatrisk läkemedelsbehandling inom BUP Stockholm

<https://www.bup.se/om-oss/samarbeten-och-samverkan/for-dig-som-ar-vardgivare/>

Internetadress Melatonin – behandling av sömnstörning hos barn

<https://janusinfo.se/behandling/expertgruppsutlatanden/psykiskhalsa.4.728c0e316219da8135bd883.html>

Läkemedelsverket Behandlingsrekommendationer, Sömnstörningar hos barn och ungdomar

<https://tinyurl.com/somnsvarigheterbarn>

PubMed PMID De Bruyne et al. Are antihistamines effective in children? A review of the evidence. Arch Dis Child. 2017

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27335428>

PubMed PMID Holdø I et al, Association between prescribing hypnotics for parents and children in Norway. 2013

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23845695>

PubMed PMID Slørdal L, Bramness JG. Er alimemazin et egnet søvnmiddel for barn? [Is alimemazine a suitable sleeping agent for children?]. Tidsskr Nor Lægeforen. 2008

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18846144>

PubMed PMID Thunander Sundbom L et al. Sedativa antihistaminer – risk för allvarlig intoxication. Läkartidningen 2021

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34590703>

Rekommendation , (Grade 2C)

<https://www.gradeworkinggroup.org/>

EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Jennie Ekman

ePedID: 3104

Fastställare/läkare: Christiane Garnemark

Versionsnummer, major: 8

Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt

Giltig fr o m: 2025-05-06

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT