



Vaccin: Infanrix hexa intramuskulär inj

mot difteri, stelkramp, kikhosta, polio, Hib, hepatit B

INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

Avdödat hexavalent vaccin med fulldos mot difteri, stelkramp och kikhosta (DTP)

Beredningsinstruktion:

Vaccinet består av två komponenter:

- Förfylld spruta med suspension (DTPa-HBV-IPV)
- Injektionsflaska med pulver (Hib)

Dessa båda komponenter ska blandas innan administrering enligt följande:
Skaka den förfyllda sprutan väl så att suspensionen blir homogen och grumligt vit. Tillsätt suspensionen till flaskan med pulvret. Skaka flaskan tills pulvret är helt upplöst. Slutvolymen blir 0,5 mL.

Det färdiga vaccinet är något grumligare än den ursprungliga suspensionen i den förfyllda sprutan.

ADMINISTRERING

Intramuskulär injektion:

Barn under 1 år: Ges i mellersta delen av lårets utsida (anterolaterala delen).

Barn från 1 år: Ges i övre tredjedelen av överarmens utsida (i deltoideusmuskeln).

Enligt författning HSLF-FS 2017:37 ange batchnummer i journalhandling.

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

Infanrix hexa (registrerad produkt)

Pulver och vätska till injektionsvätska, suspension

Förvaras i kylskåp i originalförpackning, ljuskänsligt. Får ej frysas. De två komponenterna är stabila i temperatur upp till 25 °C i 72 tim. Efter iordningställandet: vaccinet bör användas direkt, men kan förvaras i max 8 tim i högst 21 °C.

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Grundvaccination av barn födda före gestationsvecka 32+0

Dessa barn får en extra dos hexavalent vaccin i tidig ålder och följer sedan det allmänna vaccinationsprogrammet för barn.

OBS! Om första dosen ges efter 10+0 veckors okorrigerad ålder räknas denna dos som första ordinarie dos i det allmänna vaccinationsprogrammet, dvs en extra dos ges inte. Resterande 2 doser ges då vid 5 mån respektive 12 mån ålder (se nästa indikation).

Dos: 0,5 mL/dostillfälle

Dos 1 (extra dos) ges enligt följande:

Gestationsvecka vid födelse:	Tidigaste ålder för vaccination:
Mindre än 26+0	Gestationsvecka 34+0 (minst 1 vecka före hemgång)
26+0 till 29+6	6+0 veckor okorrigerad ålder
30+0 till 31+6 (vid samsjuklighet)	6+0 veckor okorrigerad ålder
30+0 till 31+6 (utan samsjuklighet)	8+0 veckor okorrigerad ålder

Det bör gå minst 4 veckor mellan den extra dosen och den efterföljande dosen.

Dos 2: vid 3 mån okorrigerad ålder

Dos 3: vid 5 mån okorrigerad ålder

Dos 4: vid 12 mån okorrigerad ålder

Grundvaccination enligt allmänna vaccinationsprogrammet

Barn födda från gestationsvecka 32+0 till fullgången tid.

Dos: 0,5 mL/dostillfälle

Dos 1: vid 3 mån ålder (tidigast vid 2,5 mån ålder)

Dos 2: vid 5 mån ålder (tidigast 6 veckor efter dos 1)

Dos 3: vid 12 mån ålder (tidigast 6 mån efter dos 2)





Vaccin: Infanrix hexa intramuskulär inj

mot difteri, stelkramp, kikhosta, polio, Hib, hepatit B

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Påskyndad grundvaccinering

Ska ordineras av läkare.

Dos: 0,5 mL/dostillfälle

Dos 1: tidigast vid 6 veckors ålder

Dos 2: tidigast 1 mån efter dos 1

Dos 3: tidigast 1 mån efter dos 2

Dos 4: vanligen vid 12 mån ålder (tidigast 6 mån efter dos 3)

Post-expositionsprofylax dos 3 - 5, nyfödd till moder med hepatit B

Dos 1 - 2 ges med monovalent vaccin vid födseln och 1 mån ålder, se annan instruktion.

Dos: 0,5 mL/dostillfälle

Dos 3: vid 3 mån ålder (tidigast vid 2,5 mån ålder)

Dos 4: vid 5 mån ålder (tidigast 6 veckor efter dos 1)

Dos 5: vid 12 mån ålder (tidigast 6 mån efter dos 2)

ÖVRIG INFORMATION

Barnhälsovården rekommenderar att varje barn får de två första doserna (primärdoserna) med samma vaccin, vid booster dosen (12 mån) kan byte ske. Vid brist på ett vaccin ska inte en dos fördröjas utan då kan byte göras redan vid dos 2.

Infanrix hexa är ett inaktiverat vaccin och kan ges i kombination med andra inaktiverade vacciner och/eller levande försvagade vacciner (även orala). Vid vaccination mot Covid-19 rekommenderas att endast ett annat inaktiverat vaccin ges samtidigt. Se även referens Janusinfo.



Vaccin: Infanrix hexa intramuskulär inj mot difteri, stelkramp, kikhosta, polio, Hib, hepatit B



REFERENS/LÄNK

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Internetadress Folkhälsomyndigheten - Barnvaccinationsprogrammet

<https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/vaccinationer/nationella-vaccinationsprogram/barnvaccinationsprogram/>

Internetadress Folkhälsomyndigheten - Rekommendationer om vaccination mot hepatit B

<https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/r/?pub=56936>

Internetadress Folkhälsomyndigheten - Vaccinationsprogram för barn. En kunskapsöversikt för hälsovårdspersonal.

<https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/v/vaccination-av-barn-det-svenska-vaccinationsprogrammet-en-kunskapsöversikt-for-halsovardspersonal/>

Janusinfo.org Allmän information om vaccinationer

<https://janusinfo.se/behandling/expertgruppsutlatanden/vaccinationer/>

Rekommendation , (Grade 2A)

<https://www.gradeworkinggroup.org/>

EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Ingehla Rydén

ePedID: 3136

Fastställare/läkare: Christiane Garnemark

Versionsnummer, major: 3

Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt

Giltig fr o m: 2025-01-27

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT