

## Omalizumab subkutan inj (Xolair) förfylld spruta 75 alt 150 mg

Denna instruktion gäller förfyllda sputor 75 mg (0,5 mL) och 150 mg (1 mL),  
koncentration 150 mg/mL.

---

### Administreringsätt

Subkutan injektion: i överarmen alternativt i låret.  
Administrering kan ta 5 - 10 sek pga lösningens viskositet.

Användning av sprutan:

- Undvik kontakt med aktiveringsklämmorna på sprutan så att det automatiska nålskyddet inte utlöses. För mer info se fass.se
- Om injektionsvätska läcker från injektionsstället för in nålen lite till.
- Håll kolven nertryckt medan nålen försiktigt dras ut från injektionsstället. Släpp därefter kolven långsamt och låt det automatiska nålskyddet täcka nålen.

---

### Vanlig indikation och dos

Behandling bör initieras av läkare med specialistkompetens inom astma  
och allergi.

#### Tilläggsbehandling vid svår allergisk astma

Barn över 6 år och över 20 kg:

Dos och doseringsintervall baseras på IgE-nivån före behandlingsstart  
(E/mL) samt av kroppsvikten (kg), se doseringstabell på fass.se.

Utvärdering av behandling bör ske efter 16 veckor. Markant förbättring av  
astman är indikation för fortsatt behandling.

Se fass.se för:

- doseringstabell
- omräkning från dos till antal injektionssprutor
- antal injektioner
- total injektionsvolym för varje administreringstillfälle

Handläggare/apotekare: Anna Hardmeier 2017-05-30 09:38:16  
Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2017-06-14 17:25:23  
Källa: www.eped.se  
Kontakt: barnlakemedel@sll.se

Läkemedelsnummer: 3173  
ID/spårnummer: 3371  
Giltig fr o m: 2017-06-14 17:25:23  
Utskriftsdatum: 2017-06-14

Kontrollera alltid att utskriften kopia är giltig. Ny version kan ha skapats sedan utskriften gjordes.



## Omalizumab subkutan inj (Xolair) förfylld spruta 75 alt 150 mg

### Tilläggsbehandling vid kronisk spontan/idiopatisk urtikaria

Dosering är inte beroende av serum-IgE eller kroppsvikt.

Barn över 12 år: 150 eller 300 mg var fjärde vecka.

Begränsad erfarenhet av behandlingstid över 6 mån.

---

### Hållbarhet preparat:

Xolair (registrerad produkt)

● 75 mg, Injektionsvätska, lösning

Hållbar: Förvaras i kylskåp (2 - 8 °C). Får ej frysas. Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt. Hållbar 4 tim i rumstemperatur. Gäller även 150 mg förfylld spruta.

---

### Övrig information

Mätning av IgE under behandling kan inte användas för dosjustering, då behandlingen i sig ökar IgE-nivåerna. Därför ska mätningar av IgE göras innan behandlingsstart. IgE-värdena är förhöjda upp till ett år efter avslutad behandling.

Plötsligt avslut av steroidbehandling bör undvikas efter insättning av omalizumab. Dosminskning av steroider bör göras successivt och under läkarkontroll.

För dosering utanför gränserna i doseringstabellen (fass.se) krävs särskilt övervägande av allergispecialist.

---

### Referens/Länk

FASS Xolair injektionsvätska 150 mg

<http://www.fass.se/LIF/product?UserType=0&nplid=20080312000022>

FASS Xolair injektionsvätska 75 mg

<http://www.fass.se/LIF/product?UserType=0&nplid=20080312000015>

Rekommendation ,(Grade 2C)

[http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm\\_loe.cfm?show=grade](http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade)

---

### Substansspecifika uppgifter

Omalizumab, R03DX05

<http://www.fass.se/LIF/substance?substancelid=ID1N900T9VLGRD3CSR&UserTypeID=0>

Handläggare/apotekare: Anna Hardmeier 2017-05-30 09:38:16

Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2017-06-14 17:25:23

Källa: www.eped.se

Kontakt: barnlakemedel@sll.se

Läkemedelsnummer: 3173

ID/spårnummer: 3371

Giltig fr o m: 2017-06-14 17:25:23

Utskriftsdatum: 2017-06-14

Kontrollera alltid att utskriven kopia är giltig. Ny version kan ha skapats sedan utskriften gjordes.

