

ISOTON AMINOSYRALÖSNING MED HEPARIN 0,2 E/ml, IA inf
aminosyror+heparin 0,2 E/ml

enl spädin-instruktion

OBS Isoton aminosyralösning kan spädas med eller utan heparin. Denna instruktion visar spädning MED heparin.

	<i>Vaminolac, inf</i>			<i>stamlösning</i>
steg 1		sterilt vatten		
	30 ml	+	20 ml	= 50 ml
	<i>stamlösning</i>			<i>IA inf</i>
steg 2		Heparin 100 E/ml		
	50 ml	+	0,1 ml	= 50,1 ml

Beredningsinstruktion: Efter spädning av Vaminolac med sterilt vatten erhålls en isoton lösning som kan infunderas i navelartärkateter. Efter tillsats av heparin, vänd/blanda sprutans innehåll noggrant.

Hållbarhet efter iordningställande: 12 tim rt, 24 tim kyl

Hållbarhet originalförp: 12 tim rt, 24 tim kyl

Varunummer: 199695, Vaminolac inf, 100 ml

Källa: FASS

Indikation: För infusion i navelartärkateter.

Vanlig dos: 1 ml/tim vilket vid kontinuerlig infusion (24 tim) ger 1 g aminosyror/dygn samt 4,8 E heparin/dygn.