



## Budesonid oralt

(ex Entocort)

### INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

Depotkapsel 3 mg (ex Entocort)  
Depottablett 9 mg (Cortiment)  
Enterokapsel 3 mg (Budenofalk)  
Enterogranulat 9 mg (Budenofalk)

### ADMINISTRERING

Oralt:  
Depotkapslarna, depottablettarna samt enterogranulatet ska sväljas hela och intas på morgonen.

Depottablettarna får inte krossas eller tuggas.

Enterokapslarna samt enterogranulatet tas ca 30 min innan måltid.

Enterogranulatet läggs på tungan och sväljes helt, med mycket vätska (t.ex. ett glas vatten). Granulatet får inte tuggas eller krossas.

Vid sväljsvårigheter kan depotkapseln öppnas och innehållet blandas i vatten, eller annan dryck med pH under 5,5 som t.ex. äppeljuice eller apelsinjuice, för omedelbar administrering. Kornen får inte tuggas eller krossas.

Enteralt:  
Depotkapselns innehåll kan slammas upp i vatten för omedelbar administrering.

### HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

#### Budesonid (registrerad produkt)

Depotkapsel, hård

Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt. Förvaras i rumstemperatur.

Enterogranulat till oral suspension, dospåse

Förvaras i rumstemperatur.

Depottablett

Förvaras vid högst 30 °C.

Enterokapsel, hård

Förvaras i rumstemperatur.

### VANLIG INDIKATION OCH DOS

#### Aktiv, mild till måttlig Crohns sjukdom i ileum och colon ascendens

Vid feber, påfrestningar och andra stressituationer kan dosen behöva höjas, alternativt kan ett tillägg av systemisk glukokortikosteroid ges.

Depotkapsel/depottablett, barn från 8 år:  
(3 -) 9 mg x 1 på morgonen under 8 veckor. Därefter trappas dosen ned gradvis under 2 veckor inför utsättning.

Enterokapsel, barn från 8 år:  
(3 -) 9 mg x 1 alt. 3 mg x 3 under 8 veckor. Därefter trappas dosen ned gradvis under 2 veckor inför utsättning.

Enterogranulat, barn från 8 år:  
9 mg x 1 på morgonen under 8 veckor. Därefter trappas dosen ned gradvis under 2 veckor inför utsättning.

### ÖVRIG INFORMATION

Långtidsbehandling med budesonid rekommenderas inte. Behandlingen bör ej överstiga 3 månader.

Budesonid kan hämma tillväxt hos barn och ungdomar. Kontroll av längdtillväxt rekommenderas.

Nedsatt leverfunktion leder till att den systemiska biotillgängligheten ökar för budesonid.

Försiktighet bör iakttas vid behandling av patienter med infektioner, diabetes mellitus, magsår, osteoporos, hypertension, glaukom eller katarakt samt patienter med arvet för diabetes eller glaukom.

Mässling och vattkoppor kan få ett förvärrat förlopp hos en patient som behandlas med orala glukokortikosteroider, försiktighet bör iakttas så att patienten inte smittas av dessa sjukdomar under behandlingens gång.



## Budesonid oralt

(ex Entocort)



### REFERENS/LÄNK

BNF-C

<http://www.medicinescomplete.com/mc/bnfc/current/>

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Internetadress Region Skåne - Stöd vid läkemedelshantering

<https://www.lakemedelshantering.se/>

Micromedex

PubMed PMID Escher JC; European Collaborative Research Group on Budesonide in Paediatric IBD. Budesonide versus prednisolone for the treatment of active Crohn's disease in children: a randomized, double-blind, controlled, multicentre trial. Eur J Gastroenterol Hepato

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15095852>

Rekommendation , (Grade 2B)

[http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm\\_loe.cfm?show=grade](http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade)

Svenska Barnläkarföreningen Svenska Föreningen för Pediatrisk Gastroenterologi, Hepatologi och Nutrition - IBD inflammatorisk tarmsjukdom hos barn och ungdomar

<http://gastro.barnlakarforeningen.se/varprogram/>

---

### EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Jennie Ekman

ePedID: 3177

Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm

Versionsnummer, major: 2

Lokal kontakt: [www.eped.se/kontakt](http://www.eped.se/kontakt)

Giltig fr o m: 2022-10-18

**KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT**