



Etakrynsyra intravenös inj 1 mg/mL

(ex. Reomax, Edecrin licens)

EN-STEGSSPÄDNING

Reomax/Edecrin		NaCl 9 mg/mL alt Glukos 50		INJ LÖ
50 mg	+	mg/mL	=	1 mg/mL
1 st		50 mL		50 mL

Beredningsinstruktion:

För vissa preparat medföljer en vätskeampull som innehåller glukos 50 mg/mL. Om volymen i denna ampull inte räcker för att späda ner till 1 mg/mL etakrynsyra (50 mL) så ska den medföljande vätskeampullen kasseras. Använd istället 50 mL glukos 50 mg/mL alt. NaCl 9 mg/mL för spädning.

ADMINISTRERINGSSÄTT

Intravenös injektion/infusion: Ges som långsam injektion alt kort infusion. Vid upprepad dos i perifer infart kan det finnas behov av att byta injektionsställe för att undvika tromboflebrit.

ÖVRIG INFORMATION

Lämpligt att i första hand välja spädning i NaCl 9 mg/mL då lösningen kan bli grumlig vid spädning i glukos 50 mg/mL. Detta beror på att vissa glukoslösningar kan ha pH under 5. Grumliga lösningar ska kasseras och inte användas.

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

Reomax/Edecrin (licensprodukt)

1 mg/mL, Injektionsvätska, lösning

HÅLLBAR: 24 tim i kylskåp, 12 tim i rumstemp

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Hjärtsvikt, njursvikt, oliguri

Ges normalt inte till barn under 1 års ålder.

Barn 1 - 18 år: 0,5 - 1 mg/kg endos.

Upprepade doser rekommenderas vanligen inte. Vid behov kan dos upprepas var 8 - 12:e tim. Max 3 mg/kg/dag.

RIMLIG DOS FÖR 1 mg/mL

	1 kg	5 kg	10 kg	50 kg
1 mg/kg	1 mL	5 mL	10 mL	50 mL

REFERENS/LÄNK

Pediatric Dosage Handbook

Rekommendation ,(Grade 2C)

http://www.essentialvidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade

Summary of Product Characteristics (SPC) Ethacrynate Valeant

<http://www.valeant.com/Portals/25/Pdf/PI/Edecrin-PI.pdf>

EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Per Nydert 2018-05-29

ePedID: 3207

Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2018-08-14

Versionsnummer, major: 2

Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt

Giltig fr o m: 2018-08-14

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT