



Etakrynsyra intravenös inj 1 mg/mL

(Reomax, Edecrin licens)

INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

Pulver till injektionsvätska 50 mg (Edecrin, Reomax licens)

EN-STEGSSPÄDNING

Reomax/Edecrin		NaCl 9 mg/mL alt Glukos 50		INJ LÖ
50 mg	+	mg/mL	=	1 mg/mL
1 st		50 mL		50 mL

Beredningsinstruktion:

För vissa preparat medföljer en vätskeampull som innehåller glukos 50 mg/mL. Om volymen i denna ampull inte räcker för att späda till 1 mg/mL etakrynsyra (50 mL) så ska den medföljande vätskeampullen kasseras. Använd istället annan förpackning med glukos 50 mg/mL alternativt NaCl 9 mg/mL för spädning.

Lösningen kan bli grumlig vid spädning i glukos 50 mg/mL. Detta beror på att vissa glukoslösningar kan ha pH under 5. Grumliga lösningar ska kasseras och inte användas.

ADMINISTRERING

Intravenös injektion/infusion: Ges som långsam injektion alternativt kort infusion på minst 5 - 10 min. Vid upprepad dos i perifer infart kan det finnas behov av att byta injektionsställe för att undvika tromboflebit.

RIMLIG DOS för Etakrynsyra intravenös inj 1 mg/mL

	1 kg	5 kg	10 kg	50 kg
1 mg/kg	1 mL	5 mL	10 mL	50 mL

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

Reomax/Edecrin (licensprodukt)

50 mg, Pulver till injektionsvätska, lösning

Förvaras i rumstemperatur.

1 mg/mL, Injektionsvätska, lösning

24 tim i kylskåp, 12 tim i rumstemperatur

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Hjärtsvikt, njursvikt, oliguri

Ordineras i samråd med specialist. Ges normalt inte till barn under 1 års ålder.

Barn 1 - 18 år: 0,5 - 1 mg/kg x 1 (- 3), max 3 mg/kg/DYGN

Upprepade doser rekommenderas vanligen inte. Vid behov kan dock dosen upprepas var 8 - 12:e tim.

Till vuxna ges vanligen 50 mg/DOS, i allvarliga fall har doser upp till 100 mg/DOS förekommit.

REFERENS/LÄNK

Pediatric Dosage Handbook

PubMed PMID Miller JL et al. Ethacrynic acid continuous infusions in critically ill pediatric patients.

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24782692>

Rekommendation (Grade 2C)

http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade

Summary of Product Characteristics (SPC) Edecrin Valeant

<http://www.valeant.com/Portals/25/Pdf/PI/Edecrin-PI.pdf>

Summary of Product Characteristics (SPC) Reomax 50 mg/20 mL

EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Ingehla Rydén 2021-12-13

ePedID: 3207

Fastställare/läkare: Charlotte Höglund 2021-12-15

Versionsnummer, major: 4

Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt

Giltig fr o m: 2021-12-15

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT