

NUMETA G16E Parenteralt energibehov 275 - 515 kcal/d

Observera att Numeta är mer koncentrerad än apoteksberett individuellt anpassat TPN.

OBS! Dosen Numeta får aldrig överstiga 100 ml/kg/dygn. Om dygnsvätskebehovet inte täcks av nutrition (inkl Numeta) och läkemedel rekommenderas i normalfallet komplettering med Glukos 50 mg/ml.

Där tillsatser inte får göras på avdelning ska Numeta med tillsatser beställas via apotekets beredningscentral. På avdelningar som tillåter tillsats på avdelning krävs att du fått utbildning i säker hantering av Numeta. Vid tillsatser rekommenderas tillsatsventil Cytoluer vnr GMC 7405 förpackning 200st.

Kan ges med fett (=alla tre kamrarna) eller utan fett (=endast två kammare, de för aminosyror och glukos) och/eller tillsatser. Bereds enligt ordination i TakeCare alt CliniSoft.

Hållbarhet och beredningsform

NUMETA G16E (Registrerad Produkt)

- 1 mL, Infusionsvätska, emulsion, Hållbar: 24 tim bytesintervall

Administreringsätt

Barn: Infusion ENDAST i central infart då lösningen har hög osmolaritet.

Vanlig indikation

Behov av parenteral nutrition. Generellt

Vanlig dosering

Dosen Numeta får aldrig överstiga 100 ml/kg/dygn. Om dygnsvätskebehovet inte täcks av nutrition (inkl Numeta) och läkemedel rekommenderas i normalfallet komplettering med Glukos 50 mg/ml.
Dygnsvätskebehovet 0 - 6 mån: 150 mL/kg/dygn

Mängden spårämnen och vitaminer som ev ska tillsättas framgår i ordination i TakeCare alt CliniSoft.

2 kg	100 % = 180 mL 50 % = 90 mL
3 kg	100 % = 270 mL 50 % = 135 mL
4 kg	100 % = 360 mL 50 % = 180 mL
5 kg	100 % = 450 mL 50 % = 225 mL
6-15 kg	Se Numeta G19E

Handläggare/apotekare: Per Nydert 2014-02-10 15:10:20

Fastställare/läkare: Ej Godkänt

Källa: www.eped.se

Kontakt: barnlakemedel@karolinska.se

Läkemedelsnummer: 3213

ID/spårnummer: 231

Giltig fr o m: 2014-02-10 15:10:20

Utskriftsdatum: 2014-02-10

Kontrollera alltid att utskriven kopia är giltig. Ny version kan ha skapats sedan utskriften gjordes.



NUMETA G16E Parenteralt energibehov 275 - 515 kcal/d

Observera att Numeta är mer koncentrerad än apoteksberett individuellt anpassat TPN.

OBS! Dosen Numeta får aldrig överstiga 100 ml/kg/dygn. Om dygnsvätskebehovet inte täcks av nutrition (inkl Numeta) och läkemedel rekommenderas i normalfallet komplettering med Glukos 50 mg/ml.

Substans

Parenteral nutrition solution combinations, B05BA10

Referens/Länk

FASS , Hämtat: 2014-02-10

<http://www.fass.se/LIF/substance?6&userType=0&substancelid=>

Lokal instruktion, Astrid Lindgrens Barnsjukhus Tillgängliga standardpåsar, Hämtat: 2014-02-10

<http://lis01.sll.se/prod/karolinska/lis/verksamhetshandbok/ALvhandbok.nsf/8831d344796a5abdc1256bce0042d1a4/4e9a2b3878f70f3dc1257c7500487370?OpenDocument>

Handläggare/apotekare: Per Nydert 2014-02-10 15:10:20

Fastställare/läkare: Ej Godkänt

Källa: www.eped.se

Kontakt: barnlakemedel@karolinska.se

Läkemedelsnummer: 3213

ID/spårnummer: 231

Giltig fr o m: 2014-02-10 15:10:20

Utskriftsdatum: 2014-02-10

Kontrollera alltid att utskriven kopia är giltig. Ny version kan ha skapats sedan utskriften gjordes.

