



Lidokain + Tetrakain utvärtes

(Rapydan, Pliaglis licens) kräm, plåster

INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

Plåster med lidokain + tetrakain 70 mg + 70 mg (Rapydan)

Kräm med lidokain + tetrakain 70 mg/g + 70 mg/g (Pliaglis, licens)
Använd endast vid rest på Rapydan plåster.

ADMINISTRERING

Utvärtes: ej på slemhinnor eller defekt hudbarriär.

Administreringstid 20 - 30 min för ytlig venpunktion och max 1 tim för bedövning av djupare strukturer.

Tetrakain gör att effekten kvarstår i flera timmar efter att plåstret/krämen avlägsnats.

Plåstret ska inte täckas med ett heltäckande förband.

Använda plåster/avtorkad kräm ska kasseras som läkemedelsavfall. Vik plåster med häftmassan inåt.

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

.Rapydan 70 + 70 mg (registrerad produkt)

Medicinskt plåster

Förvaras vid högst 25 °C.

Pliaglis 70 + 70 mg/g (licensprodukt)

Kräm

Förvaras i kylskåp. Får ej frysas. Hållbar 3 mån efter öppnandet.

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Används när lidokain+prilokain (ex Emla) inte är lämpligt.

Doserna avser MAXIMAL DYGNSDOS.

Smärta- Ytanestesi av huden i samband med ex nålstick

Barn 1 - 2 år: 1 gram kräm eller 1 plåster, max 1 tim applikationstid.

Barn 3 - 18 år: 2 gram kräm eller 2 plåster, max 1 tim applikationstid.

ÖVRIG INFORMATION

Rapydan är värmealstrande under ca 1 timme och ger vasodilatation och kan vara ett alternativ till svårstuckna barn.

Applikationstiderna gäller oavsett grad av hudpigmentering. Pigmenteringsgraden påverkar varken tid till effekt eller effekt.

Ta bort plåster/förband med kräm innan MR-undersökning.

REFERENS/LÄNK

ePed Referenser, Riktlinjer för smärtbehandling vid Astrid Lindgrens Barnsjukhus
<http://eped.se/referenser/>

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Internetadress SFBABI - Seding vid intensivvård av barn

<https://sfai.se/riktlinje/riktlinjetrad/>

Internetadress SPC Pliaglis

<https://www.medicines.org.uk/emc/product/14863/smpc>

Läkemedelsverket Behandlingsrekommendationer, Behandling av barn i samband med smärtsamma procedurer i hälso- och sjukvård

www.lakemedelsverket.se/smartsam-procedur

PubMed PMID Bond M et al. First do no harm: pain relief for the peripheral venous cannulation of adults, a systematic review and network meta-analysis. BMC Anesthesiol. 2016

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27716082>

Rekommendation , (Grade 1B)

<https://www.gradeworkinggroup.org/>



Lidokain + Tetrakain utvärtes

(Rapydan, Pliaglis licens) kräm, plåster



EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Ellen Norrhäll

ePedID: 3219

Fastställare/läkare: Christiane Garnemark

Versionsnummer, major: 3

Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt

Giltig fr o m: 2025-11-19

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT