



FELodipin oralt

(ex Plendil) depottabletter

Miljöbelastande substans, överväg annan kalciumantagonist.

INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

Depottabletter 2,5 mg, 5 mg och 10 mg (ex Plendil)

ADMINISTRERING

Oralt: Får inte delas, krossas eller tuggas.

Enteralt: För enteral administrering rekommenderas byte till annan kalciumantagonist ex amlodipin.

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

Felodipin (registrerad produkt)

Depottablett

Förvaras vid högst 25 °C. Gäller alla styrkor.

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Hypertoni (begränsad evidens)

Barn 6 - 18 år: Startdos 0,1 mg/kg x 1

Dosen kan trappas upp med 2 veckors intervall, till 0,6 mg/kg/DYGN, dock max 10 mg/DYGN

Alternativt (fast dosering)

Barn 25 - 50 kg: 2,5 - 5 (- 10) mg x 1

Barn över 50 kg: 5 - 7,5 (- 10) mg x 1

REFERENS/LÄNK

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

PubMed PMID Chaturvedi S et al. Pharmacological interventions for hypertension in children, Cochrane Database Syst Rev. 2014 Feb 1

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24488616>

PubMed PMID Flynn JT, Pasko DA, Calcium channel blockers: pharmacology and place in therapy of pediatric hypertension, Pediatr Nephrol. 2000 Dec;

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11149130>

Rekommendation , (Grade 2D)

<https://www.gradeworkinggroup.org/>

Svenska Barnläkarföreningen Svensk Barnnefrologisk Förening - Hypertoni hos barn

<http://nefro.barnlakarforeningen.se/vardprogram/>

UpToDate

<http://www.uptodate.com>

EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Nivin Asinger

ePedID: 3242

Fastställare/läkare: Christiane Garnemark

Versionsnummer, major: 2

Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt

Giltig fr o m: 2025-02-04

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT