



Fosfat oralt 30,4 mg

(Extempore) kapsel

INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

Kapsel 30,4 mg = 9,9 mg fosfor = 0,32 mmol (extempore)

ADMINISTRERING

Ska ej ges tillsammans med oralt kalcium eller oralt järn, då det sker en komplexbindning mellan dessa joner. Därför bör tidsintervallet vara minst 2 timmar mellan intag av dessa preparat.

Oralt

Enteralt: Kapslar med laktos som fyllnadsmedel kan öppnas och innehållet blandas med vatten eller bröstmjölk. Om kapselinnehållet blandas med bröstmjölk finns en risk att det reagerar med det kalcium som finns i bröstmjölken och en fällning kan bildas. Blanda därför noggrannt och kontrollera om möjligt att ingen fällning uppstår.

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

Fosfat (extempore)

30,4 mg, Kapsel, hård

HÅLLBAR: Förvaras i rumstemperatur.

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Osteopeniprofylax hos nyfödda med födelsevikt lägre än 1500 g

Barn som får OBERIKAD bröstmjölk

Startdos: ca 0,3 mmol/kg x 2 (1 kapsel/kg x 2)

Underhållsdos:

Normalintag: ca 0,6 mmol/kg x 2 (2 kapslar/kg x 2)

Vid behov av högre doser*: ca 0,6 mmol/kg x 4 (2 kapslar/kg x 4)

*Med högre doser menas ett dygnsintag av 3,5 - 4,5 mmol/kg/dygn. Detta kan behövas vid konstaterad rakit eller s-fosfat lägre än 1,6 mmol/L.

Osteopeniprofylax hos nyfödda med födelsevikt lägre än 1500 g

Barn som får delvis BERIKAD bröstmjölk (se Övrig information)

Startdos: ca 0,3 mmol/kg x 2 (1 kapsel/kg x 2)

Underhållsdos:

Normalintag: ca 0,3 mmol/kg x 2 (1 kapsel/kg x 2)

Vid behov av högre doser*: ca 0,3 mmol/kg x 2 (1 kapsel/kg x 2)

*Med högre doser menas ett dygnsintag av 3,5 - 4,5 mmol/kg/dygn. Detta kan behövas vid konstaterad rakit eller S-fosfat lägre än 1,6 mmol/L.



Fosfat oralt 30,4 mg

(Extempore) kapsel

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Hypofosfatemi t. ex. efter Foscarnetbehandling

Dos styrs av S-fosfat

1 mmol/kg fördelat på 3 - 4 doser per dygn

Om S-fosfat under 0,48 mmol/L starta med 1,3 mmol/kg fördelat på 3 - 4 doser.
Om S-fosfat över 0,48 mmol/L ges 1 mmol/kg fördelat på 3 - 4 doser.

I praktiken ges oftast 3 doser så att barnet får sova på natten:

1,3 mmol/kg fördelat på 3 doser = ca 0,4 mmol/kg x 3 (ca 1,25 kapsel/kg x 3)

1 mmol/kg fördelat på 3 doser = ca 0,3 mmol/kg x 3 (ca 1 kapsel/kg x 3)

Nyfödda: max 48 mmol/dygn

Barn 1 mån - 4 år: max 48 mmol/dygn

Barn 5 - 18 år: max 97 mmol/dygn

ÖVRIG INFORMATION

Med delvis berikad bröstmjolk menas t ex tillsats av 2 g PreNAN HMF/100 mL bröstmjolk eller tillsats av 1 påse Nutripren/100 mL bröstmjolk.

Vid indikationen osteopeniprofylax sker avslut av behandlingen för majoriteten av barn när barnet får fullberikad bröstmjolk eller prematurformula eller när de inte längre sondmatas. Om diagnostiserad rakit sker avslut när röntgen normaliserats, dock som längst till 2 mån korrigerad ålder.



Fosfat oralt 30,4 mg

(Extempore) kapsel

REFERENS/LÄNK

BNF-C

<http://www.medicinescomplete.com/mc/bnfc/current/>

Internetadress UpToDate

<http://www.uptodate.com/>

Rekommendation , (Grade 2C)

http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade

Svenska Barnläkarföreningen Svenska Neonatalföreningen - Osteopeni

<http://neo.barnlakarforeningen.se/riktlinjer-varprogram/>

EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Åsa Andersson 2021-09-08

ePedID: 3245

Fastställare/läkare: Charlotte Höglund 2021-09-08

Versionsnummer, major: 1

Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt

Giltig fr o m: 2021-09-08

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT