



Oseltamivir oralt 6 mg/mL

(ex Tamiflu) oral suspension

INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

- Alt. 1: Färdigspädd oral suspension 6 mg/mL (Tamiflu)
 Alt. 2: Pulver till oral suspension Tamiflu 6 mg/mL, späds på vårdenhets
 Alt. 3: Upplösning av kapsel 75 mg (ex Tamiflu)

INGEN SPÄDNING

Alt. 1 Färdigspädd från apotek

ORAL SUSP
6 mg/mL
 65 mL

EN-STEGSSPÄDNING

Alt. 2

Oseltamivir		Sterilt Vatten		ORAL SUSP
390 mg				6 mg/mL
1 flaska	+	55 mL	=	65 mL

Beredningsinstruktion:

Knacka på flaskan för att lösgöra pulvret. Tillsätt vattnet och skaka ordentligt i 15 sek. Pulvret bidrar med viss volym, därför blir slutvolymen 65 mL efter tillsats av 55 mL vatten. Tänk på att arbeta på ett sådant sätt att exponeringsrisken för damm minimeras, pulvret kan irritera hud och ögon.

EN-STEGSSPÄDNING

Alt. 3

Oseltamivir		Sterilt Vatten		ORAL SUSP
75 mg				6 mg/mL
1 kapsel	+	12,5 mL	=	12,5 mL

Beredningsinstruktion:

Kapseln öppnas genom att hålla den upprätt, knacka ner pulvret i botten och klippa av toppen. Häll ut allt pulver i en skål och tillsätt vattnet. Rör om i ca 2 min. Mät upp patientens dos och överför den till en ny skål. Tillsätt en liten mängd, max 1 tesked, sötat livsmedel till dosen för att dölja den bittra smaken. Ges direkt. Tänk på att arbeta på ett sådant sätt att exponeringsrisken för damm minimeras, pulvret kan irritera hud och ögon.

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Observera att behandling med oseltamivir inte är en ersättning för influensavaccination.

Behandling av influensa (känsliga influensastammar)

Nyfödda (fullgångna): 3 mg/kg x 2
 Barn 1 - 11 mån: 3 mg/kg x 2
 Barn 1 - 18 år:
 10 - 15 kg: 30 mg x 2 (5 mL x 2)
 16 - 23 kg: 45 mg x 2 (7,5 mL x 2)
 24 - 40 kg: 60 mg x 2 (10 mL x 2)
 Över 40 kg: 75 mg x 2 (12,5 mL x 2)

Behandlingstid: 5 dagar

Vid nedsatt njurfunktion överväg dosering 1 gång dagligen.

Profylax mot influensa

Nyfödda (fullgångna): 3 mg/kg x 1
 Barn 1 - 11 mån: 3 mg/kg x 1
 Barn 1 - 18 år:
 10 - 15 kg: 30 mg x 1 (5 mL x 1)
 16 - 23 kg: 45 mg x 1 (7,5 mL x 1)
 24 - 40 kg: 60 mg x 1 (10 mL x 1)
 Över 40 kg: 75 mg x 1 (12,5 mL x 1)

Behandlingstid: 10 dagar





Oseltamivir oralt 6 mg/mL

(ex Tamiflu) oral suspension

ADMINISTRERING

Oralt:

När suspensionen iordningställts från kapsel kan dosen ges med sked eller drickas direkt från skålen. Skölj ur skålen med lite vatten och ge även detta till patienten så att hela dosen kommer med.

Enteralt:

Skölj efter med vatten vid administreringen.

RIMLIG DOS för Oseltamivir oralt 6 mg/mL

	1 kg	5 kg	10 kg	50 kg
3 mg/kg	0,5 mL	2,5 mL	5 mL	-

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

Oseltamivir (registrerad produkt)

390 mg, Pulver till oral suspension

Förvaras vid högst 30 °C.

75 mg, Kapsel, hård

Förvaras vid högst 25 °C.

6 mg/mL, Oral suspension

Beredning från kapsel ska användas direkt. Vid beredning från pulver i flaska kan produkten förvaras 10 dagar i högst 25 °C.

ÖVRIG INFORMATION

Tveksam behandlingseffekt under den första levnadsmånaden pga nyfödda barns omogna leverenzym. Oseltamivir är en pro-drug som måste metaboliseras till oseltamivirkarboxylat för att ha effekt.

Effekt har visats då behandlingen inletts inom två dagar efter att symtomen först uppträtt.

Den orala suspensionen innehåller sorbitol (180 mg/mL) som kan ge diarré.

REFERENS/LÄNK

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Rekommendation , (Grade 2B)

http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade

EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Ingehla Rydén

ePedID: 3275

Fastställare/läkare: Charlotte Höglund

Versionsnummer, major: 5

Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt

Giltig fr o m: 2022-05-17

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT