



## Oseltamivir oralt 6 mg/mL

(ex Tamiflu) oral suspension

### INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

- Alt. 1: Färdigspädd oral suspension 6 mg/mL (Tamiflu)  
 Alt. 2: Pulver till oral suspension Tamiflu 6 mg/mL, späds på vårdenhet  
 Alt. 3: Upplösning av kapsel 30 mg (Tamiflu)  
 Alt. 4: Upplösning av kapsel 45 mg (Tamiflu)  
 Alt. 5: Upplösning av kapsel 75 mg (ex Tamiflu)

### INGEN SPÄDNING

Alt. 1 Färdigspädd från apotek

ORAL SUSP  
**6 mg/mL**  
 65 mL

### EN-STEGSSPÄDNING

Alt. 2

Oseltamivir		Sterilt Vatten		ORAL SUSP
390 mg	+		=	<b>6 mg/mL</b>
1 flaska		55 mL		65 mL

#### Beredningsinstruktion:

Knacka på flaskan för att lösgöra pulvret. Tillsätt vattnet och skaka ordentligt i 15 sek.  
 Pulvret bidrar med viss volym, därför blir slutvolymen 65 mL efter tillsats av 55 mL vatten.  
 Suspensionen är vit till ljusgul.

### EN-STEGSSPÄDNING

Alt. 3

Oseltamivir		Vatten*		ORAL SUSP
30 mg	+		=	<b>6 mg/mL</b>
1 kapsel		5 mL		5 mL

#### Beredningsinstruktion:

Se spädningalternativ 5 på nästa sida.

### VANLIG INDIKATION OCH DOS

Observera att behandling med oseltamivir inte är en ersättning för influensavaccination.

#### Behandling av influensa (känsliga influensastammar)

Nyfödda (fullgångna): 3 mg/kg x 2  
 Barn 1 - 11 mån: 3 mg/kg x 2

Barn 1 - 18 år:

10 - 15 kg: 30 mg x 2 (5 mL x 2)  
 16 - 23 kg: 45 mg x 2 (7,5 mL x 2)  
 24 - 40 kg: 60 mg x 2 (10 mL x 2)  
 Över 40 kg: 75 mg x 2 (12,5 mL x 2)

Behandlingstid: 5 dagar, för immunsupprimerade 10 dagar

Vid nedsatt njurfunktion kan dosjustering vara nödvändig.

#### Profylax mot influensa efter exponering

Nyfödda (fullgångna): 3 mg/kg x 1  
 Barn 1 - 11 mån: 3 mg/kg x 1

Barn 1 - 18 år:

10 - 15 kg: 30 mg x 1 (5 mL)  
 16 - 23 kg: 45 mg x 1 (7,5 mL)  
 24 - 40 kg: 60 mg x 1 (10 mL)  
 Över 40 kg: 75 mg x 1 (12,5 mL)

Behandlingstid: 10 dagar





## Osetamivir oralt 6 mg/mL

(ex Tamiflu) oral suspension

### EN-STEGSSPÄDNING

#### Alt. 4

Osetamivir		Vatten*		ORAL SUSP
45 mg				<b>6 mg/mL</b>
1 kapsel	+	7,5 mL	=	7,5 mL

#### Beredningsinstruktion:

Se spädningalternativ 5 nedan.

### EN-STEGSSPÄDNING

#### Alt. 5

Osetamivir		Vatten*		ORAL SUSP
75 mg				<b>6 mg/mL</b>
1 kapsel	+	12,5 mL	=	12,5 mL

#### Beredningsinstruktion:

\*Sterilt vatten kan vara lämpligt för infektiöskänsliga barn, till övriga patienter går kranvatten bra.

Dra upp vattnet i en oral spruta och sätt en kork/propp på sprutan. Dra bort kolven (kan kräva lite kraft). Håll kapseln upprätt, knacka ner pulvret i botten och öppna kapseln. Håll ner allt pulver i sprutan, sätt tillbaka kolven och skaka sprutan kraftigt. Pulvret har bitter smak så patientens dos kan blandas med ett sött livsmedel. Ges direkt.

### ARBETSMILJÖ

Exponeringsrisk för läkemedelsdamm. Använd lämplig skyddsutrustning vid beredning av pulver till oral suspension eller öppnande av kapsel. Pulvret kan irritera hud och ögon.

### ADMINISTRERING

Oralt

Enteralt

### RIMLIG DOS för Osetamivir oralt 6 mg/mL

	1 kg	5 kg	10 kg	50 kg
3 mg/kg	0,5 mL	2,5 mL	5 mL	-

### ÖVRIG INFORMATION

Tveksam behandlingseffekt under den första levnadsmånaden pga nyfödda barns omogna leverenzym. Osetamivir är en pro-drug som måste metaboliseras till osetamivirkarboxylat för att ha effekt.

Effekt har visats då behandlingen inletts inom två dagar efter att symtomen först uppträtt.

Den orala suspensionen innehåller sorbitol (180 mg/mL) som kan ge diarré.

### REFERENS/LÄNK

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Läkemedelsverket Behandlingsrekommendationer, Behandling och profylax vid influensa

<https://www.lakemedelsverket.se/sv/behandling-och-forskrivning/behandlingsrekommendationer/sok-behandlingsrekommendationer?q=influensa>

PubMed PMID J-W Liu et al. Comparison of antiviral agents for seasonal influenza outcomes in healthy adults and children. JAMA Netw Open. 2021

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34387680>

PubMed PMID Manuel J et al. Comparison of efficacy and safety of baloxavir and osetamivir in children with influenza: a systematic review and meta-analysis, Cureus 2024.

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/39529764>

PubMed PMID Mattila J-M et al. Osetamivir treatment of influenza A and B infections in infants, Influenza Other Respir Viruses. 2021

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/33939270>

Rekommendation , (Grade 2B)

<https://www.gradeworkinggroup.org/>

### EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Ingehla Rydén

ePedID: 3275

Fastställare/läkare: Christiane Garnemark

Versionsnummer, major: 6

Lokal kontakt: [www.eped.se/kontakt](http://www.eped.se/kontakt)

Giltig fr o m: 2025-03-18

**KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT**





## Osetamivir oralt 6 mg/mL

(ex Tamiflu) oral suspension

### HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

#### Osetamivir (registrerad produkt)

390 mg, Pulver till oral suspension

Förvaras vid högst 30 °C.

6 mg/mL, Oral suspension

Beredning från kapsel ska användas direkt. Vid beredning från pulver i flaska kan produkten förvaras 10 dagar i högst 25 °C.

75 mg, Kapsel, hård

Förvaras vid högst 25 °C. Gäller alla styrkor.