



Adrenalin intramuskulär inj (ex Emerade) förfylld injektionspenna

INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

Lösning i förfylld injektionspenna:
Emerade 150, 300 och 500 mikrog
EpiPen jr 150 mikrog och EpiPen 300 mikrog
Jext 150 och 300 mikrog
Anapen Junior 0,15 mg/dos och Anapen 0,3 mg/dos

ARBETSMILJÖ

Undvik direktkontakt, stänk på huden och i ögonen kan ge sveda, rodnad och klåda .

ADMINISTRERING

Intramuskulär injektion: Ska injiceras i lårets främre, övre, yttre kvadrant.
Massage runt injektionsstället påskyndar absorptionen.
Kan ges genom kläder.

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

Adrenalin förfylld injektionspenna (registrerad produkt)

0,15 mg/dos, Injektionsvätska, lösning, förfylld injektionspenna
HÅLLBAR: Förvaras i högst 25 °C. Får ej frysas. Anapen, Emerade och EpiPen ska förvaras i ytterkartong pga ljuskänslighet, men det behöver inte Jext.
Informationen gäller alla styrkor.

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Anafylaxi

Barn under 20 kg: 150 mikrog/dos = 0,15 mg/dos
Barn 20 - 60 kg: 300 mikrog/dos = 0,3 mg/dos
Barn över 60 kg: 300 - 500 mikrog/dos = 0,3 - 0,5 mg/dos

Ibland kan ytterligare en dos vara nödvändig 5 - 15 minuter efter den första injektionen.

ÖVRIG INFORMATION

Doserna skiljer sig från rekommenderade doser i Fass, vid utfärdande av recept skriv "Obs".

Anafylaxi ska utredas av allergikunnig läkare som också tar ställning till eventuell förskrivning av adrenalinpenna.

REFERENS/LÄNK

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Internetadress Läkemedelsverket Nyhet: Fortsatta problem med Emerade adrenalinpenna

<https://www.lakemedelsverket.se/sv/nyheter/uppdatering-om-aktiveringsfel-gallande-emerade-adrenalinlosning-aktiveringspenna>

Internetadress VISS.nu Kunskapsstöd för primärvården: Åtgärder vid anafylaxi (Region Stockholm)

<https://viss.nu/kunskapsstod/vardprogram/atgarder-vid-anafylaxi>

PubMed PMID Brown J. Epinephrine, auto-injectors and anaphylaxis: a challenge of doses, depth and device. Annals of Allergy, Asthma & Immunology 2018

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29746901>

Rekommendation ,(Grade 1A)

http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade

Svenska Barnläkarföreningen Delföreningen för allergi och lungmedicin - Riktlinjer Allergi - Anafylaxi/anafylaktisk reaktion (D1)

<https://aol.barnlakarforeningen.se/riktlinjer/riktlinjer-allergi/>



Adrenalin intramuskulär inj (ex Emerade) förfylld injektionspenna



EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Åsa Andersson 2021-05-04

ePedID: 3276

Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2021-05-05

Versionsnummer, major: 4

Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt

Giltig fr o m: 2021-05-05

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT