



Adrenalin intramuskulär inj

(ex EpiPen) förfylld injektionspenna

INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

Lösning i förfylld injektionspenna:

EpiPen jr 150 mikrog och EpiPen 300 mikrog

Jext 150 och 300 mikrog

Anapen Junior 0,15 mg/dos och Anapen 0,3 mg/dos

Emerade 150, 300 och 500 mikrog är restnoterade under lång tid.

ARBETSMILJÖ

Undvik direktkontakt med produkten. Stänk på huden och i ögonen kan ge sveda, rodnad och klåda.

ADMINISTRERING

Intramuskulär injektion: i lårets främre, övre, yttre kvadrant.

Massage runt injektionsstället påskyndar absorptionen.

Kan ges genom kläder.

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

Adrenalin förfylld injektionspenna (registrerad produkt)

Injektionsvätska, lösning, förfylld injektionspenna

Förvaras i högst 25 °C. Får ej frysas. Anapen och EpiPen ska förvaras i ytterkartong pga ljuskänslighet, men Emerade och Jext ska förvaras i medföljande plastfodral.

Informationen gäller alla styrkor.

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Anafylaxi

För barn under 7,5 kg rekommenderas dosering från ampull (se annan instruktion). Minsta dos från förfylld penna (150 mikrog) ger upp till 200 % av den rekommenderade dosen och ska endast ges vid livshotande situationer där dosering från ampull inte är möjligt.

Barn 7,5 - 20 kg: 150 mikrog = 0,15 mg

Barn 21 - 60 kg: 300 mikrog = 0,3 mg

Barn över 60 kg: 300 - 500 mikrog = 0,3 - 0,5 mg

Ibland kan ytterligare en dos vara nödvändig 5 - 15 minuter efter den första injektionen.

ÖVRIG INFORMATION

Doserna skiljer sig från rekommenderade doser i produktresuméer, vid receptförskrivning skriv "Obs".

Anafylaxi ska utredas av allergikunnig läkare som också tar ställning till eventuell förskrivning av adrenalinpenna.



Adrenalin intramuskulär inj

(ex EpiPen) förfylld injektionspenna



REFERENS/LÄNK

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Internetadress Svenska Föreningen för Allergologi - Anafylaxi

<https://www.sffa.nu/riktlinjer/>

Internetadress Viss - Kunskapsstöd för primärvården: Åtgärder vid anafylaxi (Region Stockholm)

<https://viss.nu/kunskapsstod/vardprogram/atgarder-vid-anafylaxi>

PubMed PMID Brown J. Epinephrine, auto-injectors and anaphylaxis: a challenge of doses, depth and device. *Annals of Allergy, Asthma & Immunology* 2018

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29746901>

Rekommendation , (Grade 1A)

<https://www.gradeworkinggroup.org/>

Svenska Barnläkarföreningen Delföreningen för allergi och lungmedicin - Riktlinjer Anafylaxi - Länk till Nationellt Vårdprogram Anafylaxi, SFFA (Svensk Förening för Allergologi)

<https://aol.barnlakarforeningen.se/riktlinjer/riktlinjer-allergi/>

EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Åsa Andersson

ePedID: 3276

Fastställare/läkare: Christiane Garnemark

Versionsnummer, major: 5

Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt

Giltig fr o m: 2025-02-27

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT