



## Adrenalin intramuskulär inj

(ex EpiPen) förfylld injektionspenna

### INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

Lösning i förfylld injektionspenna:

EpiPen jr 150 mikrog och EpiPen 300 mikrog

Jext 150 och 300 mikrog

Anapen Junior 0,15 mg/dos och Anapen 0,3 mg/dos

### ARBETSMILJÖ

Undvik direktkontakt med produkten. Stänk på huden och i ögonen kan ge sveda, rodnad och klåda.

### ADMINISTRERING

Intramuskulär injektion: i lårets främre, övre, yttre kvadrant.

Massage runt injektionsstället påskyndar absorptionen.

Kan ges genom kläder.

### HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

#### Adrenalin förfylld injektionspenna (registrerad produkt)

Injektionsvätska, lösning, förfylld injektionspenna

Förvaras i högst 25 °C. Får ej frysas. Anapen och EpiPen ska förvaras i ytterkartongen pga ljuskänslighet. Jext ska förvaras i medföljande plastfodral. Informationen gäller båda styrkorna.

### VANLIG INDIKATION OCH DOS

#### Anafylaxi

För barn under 7,5 kg rekommenderas dosering från ampull (se annan instruktion). Minsta dos från förfylld penna (150 mikrog) ger upp till 200 % av den rekommenderade dosen och ska endast ges vid livshotande situationer där dosering från ampull inte är möjligt.

Barn 7,5 - 20 kg: 150 mikrog = 0,15 mg

Barn över 20 kg: 300 mikrog = 0,3 mg

ibland kan ytterligare en dos vara nödvändig 5 - 15 minuter efter den första injektionen.

### ÖVRIG INFORMATION

Doserna skiljer sig från rekommenderade doser i produktresuméer, vid receptförskrivning skriv "Obs".

Anafylaxi ska utredas av allergikunnig läkare som också tar ställning till eventuell förskrivning av adrenalinpenna.

### REFERENS/LÄNK

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Internetadress Svenska Föreningen för Allergologi - Nationellt vårdprogram anafylaxi

<https://www.sffa.nu/riktlinjer/>

Internetadress Viss - Kunskapsstöd för primärvården: Åtgärder vid anafylaxi (Region Stockholm)

<https://viss.nu/kunskapsstod/vardprogram/atgarder-vid-anafylaxi>

PubMed PMID Brown J. Epinephrine, auto-injectors and anaphylaxis: a challenge of doses, depth and device. *Annals of Allergy, Asthma & Immunology* 2018

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29746901>

Rekommendation , (Grade 1A)

<https://www.gradeworkinggroup.org/>

Svenska Barnläkarföreningen Delföreningen för allergi och lungmedicin - Riktlinjer Anafylaxi

<https://aol.barnlakarforeningen.se/riktlinjer/riktlinjer-allergi/>



## Adrenalin intramuskulär inj (ex EpiPen) förfylld injektionspenna



### EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Åsa Andersson

ePedID: 3276

Fastställare/läkare: Christiane Garnemark

Versionsnummer, major: 6

Lokal kontakt: [www.eped.se/kontakt](http://www.eped.se/kontakt)

Giltig fr o m: 2026-04-08

**KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT**