



Rabies-immunglobulin humant, intramuskulär inj 150 E/mL

(Berirab/Berirab P licens)

INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

Humant rabies-immunglobulin (HRIG) (Berirab/Berirab P)

Nationell beredskapslicens finns.

Förfylld spruta 2 mL (innehåller minst 300 E rabiesantikroppar)

ADMINISTRERING

Intramuskulär injektion:

Så mycket som möjligt av dosen ska ges i och runt såret/såren (även om såren är läkta).

Att ge resterande volym på annan plats intramuskulärt anses numera ha ytterst begränsad effekt. Undantaget är exponering av slemhinnor då hela dosen ges intramuskulärt i annan kroppsdel än rabiesvaccinet.

Ges normalt outspätt, men ordinerad dos kan spädas med NaCl 9 mg/mL om det finns multipla sår att infiltrera.

Biologiskt läkemedel. Enligt författning HSLF-FS 2017:37 ange batchnummer i journalhandling.

RIMLIG DOS för Rabies-immunglobulin humant, intramuskulär inj 150 E/mL

	1 kg	5 kg	10 kg	50 kg
20 E/kg	0,13 mL	0,67 mL	1,33 mL	6,67 mL

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

Berirab/Berirab P (humant rabiesimmunoglobulin, HRIG) (licensprodukt)

150 E/mL, Injektionsvätska, intramuskulär

Förvaras i kylskåp. Får ej frysas. Förvaras i ytterkartongen, ljuskänsligt. Påbörjad spruta ska användas samma dag.

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Behandlingsanvisningarna i denna instruktion följer WHO:s och Folkhälsomyndighetens reviderade rekommendationer från 2018 respektive 2019 och kan därför skilja sig från produktresumén för aktuellt preparat.

Angående exponeringskategorier I - III, se Övrig information.

Postexpositionsprofylax (PEP)

Ges alltid i kombination med rabiesvaccin. Dosen bör ges i samband med, eller så snart som möjligt efter, första dosen vaccin.

HRIG kan ges upp till 7 dagar efter första dosen vaccin.
Om mer än 7 dagar har gått är HRIG-behandling inte meningsfull.

Nyfödda: 20 E/kg, engångsdos

Barn 1 mån - 18 år: 20 E/kg, engångsdos

Tidigare OVACCINERAD patient:

HRIG ges vid exponering enligt kategori III.

Vid osäkerhet om exponeringen tillhör kategori II eller III ska den bedömas som kategori III.

IMMUNSUPPRIMERAD patient:

HRIG ges vid exponering enligt både kategori II och III.

Tidigare FULLT GRUNDVACCINERAD patient:

HRIG ges inte, endast rabiesvaccin.



Rabies-immunglobulin humant, intramuskulär inj 150 E/mL

(Berirab/Berirab P licens)

ÖVRIG INFORMATION

Mycket viktigt med noggrann rengöring av sårområdet/sårområdena. Detta ska ske omgående eller så snart som möjligt och göras med tvål eller huddesinfektionsmedel samt rikliga mängder rinnande vatten i 15 min.

Exponeringskategorier:

Kategori I (ingen exponering): klappat eller matat djur, slickning på intakt hud.

Kategori II (exponering): nafsning på ej täckt hud, mindre rivsår eller skrapår utan blödning.

Kategori III (allvarlig exponering): enstaka eller multipla transdermala bett eller klösningar, slickning på skadad hud eller slemhinna, bett eller skrapår av fladdermöss.

Undvik om möjligt samtidig behandling med immunnedsättande läkemedel.

P:et i Berirab P står för pastöriserad. Nu för tiden är dock även Berirab pastöriserad så det är ingen skillnad på preparaten.

REFERENS/LÄNK

Folkhälsomyndigheten Rekommendationer om förebyggande av rabies

<https://www.folkhalsomyndigheten.se/publikationer-och-material/publikationsarkiv/r/rekommendationer-om-forebyggande-atgarder-mot-rabies/>

Internetadress WHO - Rabies vaccines: position paper april 2018

<https://www.who.int/publications/i/item/who-wer9316>

Rekommendation , (Grade 1C)

<https://www.gradeworkinggroup.org/>

Summary of Product Characteristics (SPC) Berirab/Berirab P solution for intramuscular injection

EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Ingehla Rydén

ePedID: 3310

Fastställare/läkare: Christiane Garnemark

Versionsnummer, major: 3

Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt

Giltig fr o m: 2025-09-01

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT