



Vaccin: RotaTeq oralt

mot rotavirus, oral lösning

Kontraindicerat till underburen född före v 25+0, vid tidigare invagination, allvarlig immunbrist eller överkänslighet mot sackaros, se Övrig information.

Smittrisk till immunsupprimerade patienter, se Övrig information.

Senarelägg vaccineringen vid pågående diarré, kräkning och/eller allvarlig febersjukdom.

INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

Levande försvagat vaccin mot rotavirus, endosbehållare

INGEN SPÄDNING

ORAL LÖSN

1 dos

2 mL

ADMINISTRERING

Oralt:

Endosbehållaren kan tas ut ur kylskåpet 15 min innan administreringen. Tryck ut vätskan från endosbehållaren direkt i barnets mun mot kindens insida. Upprepade tryck på behållaren kan behövas för att få ut allt vaccin.

Lösningen ska vara blekgul och klar, men kan ha en rosa nyans.

Om barnet spottar ut eller kräks upp dosen ska inte ny dos ges.

Vaccin som spills eller spottas ut ska torkas bort med desinfektionsmedel. Händer tvättas med tvål och vatten och handsprit.

Enligt författning HSLF-FS 2017:37 ange batchnummer i journalhandling.

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

RotaTeq (registrerad produkt)

1 dos, Oral lösning

Förvaras i kylskåp. Förvaras i ytterkartongen, ljuskänsligt. Används direkt när endosbehållaren har öppnats.

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Första dosen ska ges före 12 veckors ålder, annars ska barnet inte alls vaccineras mot rotavirus.

Grundvaccination enligt allmänna vaccinationsprogrammet

Barn födda från gestationsvecka 25+0

Ökad risk för apnéer hos barn födda före graviditetsvecka 29. Beakta behov av andningsövervakning under 48 - 72 tim efter vaccinationen.

Dos: 2 mL/dos

Dos 1: vid 6 v ålder (senast före 12 v ålder)

Dos 2: vid 3 mån ålder (tidigast 4 v efter dos 1, senast före 16 v ålder)

Dos 3: vid 5 mån ålder (tidigast 4 v efter dos 2, senast före 32 v ålder)

ÖVRIG INFORMATION

Relativa kontraindikationer är missbildning i mag-tarmkanalen som kan vara predisponerande för invagination, tidigare bukoperation, pågående utredning för mag-tarmsjukdom, behandling med immunsupprimerande läkemedel, fruktosintolerans, glukos-galaktosmalabsorption eller sukras-isomaltasbrist.

RotaTeq utsöndras till viss del via avföringen vilket kan medföra risk för smitta av anhöriga, medpatienter eller andra med nära kontakt och som har nedsatt immunförsvar. Risken är dock låg och vaccinering av inneliggande patient kan genomföras på neonatalavdelning. Viktigt att följa gällande hygienrutiner och enkelrum rekommenderas.

Rotavirusvaccin är levande försvagade vaccin och kan ges i kombination med andra levande försvagade vacciner och/eller inaktiverade vacciner. Se även referens Janusinfo.

RotaTeq är helt utbytbar mot Rotarix. Om en dos Rotarix är given ges två doser RotaTeq.





Vaccin: RotaTeq oralt

mot rotavirus, oral lösning

REFERENS/LÄNK

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Folkhälsomyndigheten Barnvaccinationsprogrammet

<https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/vaccinationer/nationella-vaccinationsprogram/barnvaccinationsprogram/>

Folkhälsomyndigheten Rekommendationer om vaccination av för tidigt födda barn

<https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/vaccinationer/rekommendationer-for-vaccination/rekommendation-for-vaccination-av-for-tidigt-fodda-barn/>

Folkhälsomyndigheten Rekommendationer om vaccination mot rotavirus till sjukhusvårdade barn på neonatalavdelning

<https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/vaccinationer/rekommendationer-for-vaccination/rekommendation-om-vaccination-mot-rotavirus-till-sjukhusvardade-barn-pa-neonatalavdelning>

Folkhälsomyndigheten Vaccination mot rotavirus

<https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/vaccinationer/vaccinationer-i-sverige/rotavirus/>

Folkhälsomyndigheten Vaccinationsprogram för barn. En kunskapsöversikt för hälsovårdspersonal.

<https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/v/vaccination-av-barn-det-svenska-vaccinationsprogrammet-en-kunskapsöversikt-for-halsovardspersonal/>

Internetadress Rikshandboken Barnhälsovård - Vaccin mot rotavirusinfektion

<https://www.rikshandboken-bhv.se/vaccination/vaccinationsprogram/vacciner-i-det-allmanna-barnvaccinationsprogrammet/vaccin-mot-rotavirusinfektion/>

Janusinfo Allmän information om vaccinationer

<https://janusinfo.se/behandling/expertgruppsutlatanden/vaccinationer/>

Rekommendation , (Grade 2A)

<https://www.gradeworkinggroup.org/>

Svenska Barnläkarföreningen Svenska Neonatalföreningen - Vaccinationer på neonatalavdelning

<https://neo.barnlakarforeningen.se/riktlinjer-varldprogram/infektion/>

LOKAL LÄNK

Lokal instruktion, begränsad åtkomst

http://eped.sll.sjunet.org/eped_extra/lokalreferens.html#3312

EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Ingehla Rydén

Fastställare/läkare: Christiane Garnemark

Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt

ePedID: 3312

Versionsnummer, major: 5

Giltig fr o m: 2025-09-30

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT

ePedID: 3312.5 Giltig fr o m: 2025-09-30

Versionshantering: http://eped.sll.sjunet.org/eped/instructions/show_instruction_3312.html