



Vaccin: Rabipur intramuskulär inj 2,5 E/mL

mot rabies

EN-STEGSSPÄDNING

Rabipur		Medföljande vätska		IM INJ
2,5 E				
1 st	+	1 mL	=	2,5 E/mL
				1 mL

Beredningsinstruktion:

Förpackningen innehåller två likadana orange nålar (25 gauge), en för rekonstituering och en för administrering.

Lös upp pulvret med lösningen i den medföljande förfyllda sprutan med hjälp av den ena orange nålen. Det är undertryck i injektionsflaskan. För att underlätta uppdragning av det färdiga vaccinet tillbaka till den medföljande sprutan bör sprutan skruvas loss något från nålen (utan att kontakten bryts) så att undertrycket försvinner. Obs - nålen når inte till botten av injektionsflaskan, vänd därför flaskan upp och ner och dra tillbaka nålen nära proppen så att all lösning kan dras ut från flaskan.

Kassera den använda nålen när lösningen är uppdragen i sprutan och använd den andra medföljande nålen för att administrera vaccinet.

Färdigberedd lösning ska vara klar till något grumlig och färglös till lite rosa.

ADMINISTRERING

Skaka lösningen försiktigt innan administrering.

Intramuskulär injektion:

Barn under 2 år: Ges i mellersta delen av lårets utsida (anterolaterala delen).

Barn från 2 år: Ges i övre tredjedelen av överarmens utsida (i deltoideusmuskeln).

Vaccinet ska ges i annan kroppsdel än eventuellt rabies-immunglobulin.

Vaccinet får inte administreras intravenöst eller subkutant.

Biologiskt läkemedel. Enligt författning HSLF-FS 2017:37 ange batchnummer i journalhandling.

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Behandlingsanvisningarna i denna instruktion följer WHO:s och Folkhälsomyndighetens reviderade rekommendationer från 2018 respektive 2019 och kan därför skilja sig från produktresumén för aktuellt preparat.

HRIG = humant rabies-immunglobulin

Preexpositionsprofylax (PrEP)/grundvaccination

Nyfödda: 2,5 E = 1 mL/dos

Barn 1 mån - 18 år: 2,5 E = 1 mL/dos

Två doser ska ges: dag 0 och dag 7

Till immunsupprimerad patient ges 3 doser:
dag 0, dag 7 samt valfri dag mellan dag 21 och dag 28

Boosterdos ges inte rutinmässigt, men rekommenderas om antikropps-nivån är under 0,5 E/mL. Antikropps-nivån bör i första hand kontrolleras hos immunsupprimerade patienter.



Vaccin: Rabipur intramuskulär inj 2,5 E/mL

mot rabies

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

Rabipur (registrerad produkt)

2,5 E, Pulver och vätska till injektionsvätska, lösning i förfylld spruta

Förvaras i kylskåp, får ej frysas. Förvaras i ytterkartongen, ljuskänsligt.

2,5 E/mL, Injektionsvätska, intramuskulär

Bör användas direkt, senast 6 tim efter iordningställandet. Förvaras i kylskåp.

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Postexpositionsprofylax (PEP)

Ges vid exposition enligt kategori II och III, se Övrig information. Vid osäkerhet till vilken av dessa kategorier expositionen hör ska den bedömas som kategori III.

Om osäkerhet råder när eller om tidigare vaccination givits ska patienten behandlas som "ovaccinerad".

Behandlingen ska påbörjas så snart som möjligt efter exponeringen, men det finns ingen borte tidsgräns för när behandlingen kan påbörjas.

Nyfödda: 2,5 E = 1 mL/dos

Barn 1 mån - 18 år: 2,5 E = 1 mL/dos

Tidigare GRUNDVACCINERAD patient:

Två doser ska ges: dag 0 och dag 3. HRIG ges inte.

Tidigare OVACCINERAD patient:

Vaccination ges antingen enligt Essen-schema eller enligt Zagreb-schema.

Påbörjat schema ska fullföljas, dvs byte mellan de två schemana ska inte ske.

HRIG ges vid exposition enligt kategori III.

Essen-schema:

Fyra doser ska ges: dag 0, dag 3, dag 7 samt valfri dag mellan dag 14 och dag 28

Zagreb- schema:

Fyra doser ska ges: dag 0 ges 2 doser (ges på olika kroppssidor),
därefter 1 dos vardera dag 7 och dag 21

IMMUNSUPPRIMERAD patient:

Fem doser ges oavsett tidigare grundvaccinering eller ej:
dag 0, dag 3, dag 7, dag 14 och dag 28.

Antikropps-nivån bör kontrolleras efter fullgjord vaccinering.

HRIG ges vid exposition enligt både kategori II och III.





Vaccin: Rabipur intramuskulär inj 2,5 E/mL mot rabies

ÖVRIG INFORMATION

Mycket viktigt med noggrann rengöring av sårområdet/sårområdena. Detta ska ske omgående eller så snart som möjligt och göras med tvål eller huddesinfektionsmedel samt rikliga mängder rinnande vatten i 15 min.

Exponeringskategorier:

Kategori I (ingen exponering): klappat eller matat djur, slickning på intakt hud.

Kategori II (exponering): nafsning på ej täckt hud, mindre rivsår eller skrapsår utan blödning.

Kategori III (allvarlig exponering): enstaka eller multipla transdermala bett eller klösningar, slickning på skadad hud eller slemhinna, bett eller skrapsår av fladdermöss.

För patient som påbörjat vaccination på annan ort fullföljs vaccinationen enligt schemat. Det förutsätter dock att det är känt vilket vaccin som getts och att ett av WHO godkänt schema har använts. Om en dos missats eller inte getts enligt schemat rekommenderas att vaccinationen "återupptas" och inte startas på nytt. Nästa givna dos räknas då som den missade dosen och efterföljande tidsintervall justeras. Ändring av administrationssätt eller vaccin kan accepteras i de fall då det inte kan undvikas. Se även referens Folkhälsomyndigheten - Rekommendationer om förebyggande åtgärder mot rabies.

Rabiesvaccin är ett inaktiverat vaccin och kan ges i kombination med andra inaktiverade vacciner och/eller levande försvagade vacciner (även orala). Se även referens Janusinfo.





Vaccin: Rabipur intramuskulär inj 2,5 E/mL mot rabies

REFERENS/LÄNK

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Folkhälsomyndigheten Rekommendationer om förebyggande av rabies

<https://www.folkhalsomyndigheten.se/publikationer-och-material/publikationsarkiv/r/rekommendationer-om-forebyggande-atgarder-mot-rabies/>

Internetadress Smittskyddsläkarföreningen - Smittskyddsblad rabies

<https://slf.se/smittskyddslakarforeningen/smittskyddsblad/>

Internetadress WHO - Rabies vaccines: position paper april 2018

<https://www.who.int/publications/i/item/who-wer9316>

Janusinfo Allmän information om vaccinationer

<https://janusinfo.se/behandling/expertgruppsutlatanden/vaccinationer/>

Rekommendation , (Grade 1C)

<https://www.gradeworkinggroup.org/>

EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Ingehla Rydén

ePedID: 3323

Fastställare/läkare: Christiane Garnemark

Versionsnummer, major: 5

Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt

Giltig fr o m: 2025-09-30

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT