



Nitrofurantoin oralt

(ex Furadantin) tabletter

Kontraindicerat till nyfödda.

INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

Tabletter 5 och 50 mg

ADMINISTRERINGSSÄTT

Oralt:

Ska intas med mat för ökad absorption och för att minska risken för illamående.

Tabletterna kan krossas och blandas i lite vätska eller blandas i mat.

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

Nitrofurantoin (registrerad produkt)

5 mg, Tablett

HÅLLBAR: Förvaras i rumstemperatur, gäller båda styrkorna.

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Urinvägsinfektion utan njurengagemang

Barn 1 mån - 18 år: 1,5 mg/kg x 2, max 400 mg/dygn

Behandlingstid:

Barn under 2 år: 10 dagar

Barn från 2 år: 5 dagar

Urinvägsinfektion, profylaxbehandling

Barn 1 mån - 18 år: 1 mg/kg x 1

Ges vanligen till kvällen/natten.

Antibiotikaprofylax vid miktionsuretrocytografi (MUC/MUCG)

Barn 1 mån - 18 år: engångsdos 1 - 2 mg/kg

ÖVRIG INFORMATION

Får ej ges till nyfödda då nitrofurantoin kan inducera hemolytisk anemi om patientens röda blodkroppar har otillräckliga mängder reducerat glutatation.

Nitrofurantoin ska inte heller ges till barn med GFR under 40 mL/min.

REFERENS/LÄNK

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Internetadress RAF, Referensgruppen för antibiotikafrågor – Antibiotikakompendium

<https://www.sls.se/raf/lakemedel/antibiotikakompendium/>

Rekommendation , (Grade 1B)

http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade

Svenska Barnläkarföreningen Svensk Barnnefrologisk Förening - UVI-riktlinjer

<http://nefro.barnlakarforeningen.se/vardprogram/>

LOKAL LÄNK

Lokal instruktion, begränsad åtkomst

http://eped.sll.sjunet.org/eped_extra/lokalreferens.html#3328



Nitrofurantoin oralt

(ex Furadantin) tabletter



EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Ingehla Rydén 2020-02-10
Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2020-02-10
Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt

ePedID: 3328
Versionsnummer, major: 3
Giltig fr o m: 2020-02-10

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT