



## cefTIBUten oralt 400 mg

(Isocef licens) kapsel

### INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

Kapsel 400 mg

Till följd av kapslarnas styrka är dessa endast lämpliga att ge till barn från 45 kg. Till mindre barn rekommenderas ceftributen oral suspension 36 mg/mL, se annan instruktion.

### ARBETSMILJÖ

Allergisk, hantera enligt lokal rutin, cefalosporiner kan vid inandning och hudkontakt ge allergiska reaktioner.

### ADMINISTRERINGSSÄTT

Oralt:

Kapslarna kan tas oberoende av måltid.

### HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

#### Isocef (licensprodukt)

400 mg, Kapsel, hård

HÅLLBAR: Förvaras vid högst 25 °C.

### VANLIG INDIKATION OCH DOS

#### Urinvägsinfektion, vid misstänkt njurengagemang eller oklar nivå

Barn över 45 kg: 400 mg x 1

Behandlingstid:

Barn över 2 år, utan njurengagemang: 5 dagar

Barn över 2 år, med njurengagemang: 10 dagar

#### Antibiotikaproylax vid miktionsurocystografi (MUC/MUCG) (andrahandsval)

Barn över 45 kg: engångsdos 400 mg

### REFERENS/LÄNK

Internetadress RAF, Referensgruppen för antibiotikafrågor – Antibiotikakompendium

<https://www.sls.se/raf/lakemedel/antibiotikakompendium/>

Rekommendation ,(Grade 1C)

[http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm\\_loe.cfm?show=grade](http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade)

Summary of Product Characteristics (SPC) Isocef

Svenska Barnläkarföreningen Svensk Barnnefrologisk Förening - UVI-riktlinjer

<http://nefro.barnlakarforeningen.se/vardprogram/>

### LOKAL LÄNK

Lokal instruktion, begränsad åtkomst

[http://eped.sll.sjunet.org/eped\\_extra/lokalreferens.html#3330](http://eped.sll.sjunet.org/eped_extra/lokalreferens.html#3330)

### EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Ingehla Rydén 2020-08-19

ePedID: 3330

Fastställare/läkare: Charlotte Höglund 2020-08-19

Versionsnummer, major: 3

Lokal kontakt: [www.eped.se/kontakt](http://www.eped.se/kontakt)

Giltig fr o m: 2020-08-19

**KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT**