



Racekadotril oralt

(ex Hidrasec) granulat

INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

Granulat till oral suspension 10 och 30 mg (Hidrasec)
Licensläkemedel granulat till oral suspension 10 mg (Tiorfan)

Vid behov kan granulatet slamas upp och delmängd administreras, se annan instruktion.

ADMINISTRERING

Oralt: Granulatet kan blandas i mat, vatten eller vätskeersättning. Blanda väl.

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

Hidrasec (registrerad produkt)

10 mg, Granulat till oral suspension

HÅLLBAR: Inga särskilda förvaringsanvisningar. Används omgående efter blandning med mat eller vätska. Gäller även 30 mg.

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Kompletterande symtomatisk behandling av akut diarré

Barn över 3 mån: 1,5 mg/kg x 3

Alternativt (fast dosering):

Barn över 3 mån och under 9 kg: 10 mg x 3

Barn 9 - 12 kg: 20 mg x 3

Barn 13 - 27 kg: 30 mg x 3

Barn över 27 kg: 60 mg x 3

Behandling bör fortsätta tills barnet haft två normala avföringar.

Behandlingstid max 7 dagar.

ÖVRIG INFORMATION

Innehåller sackaros.

Ges tillsammans med vätskeersättning och vanliga stödåtgärder.

REFERENS/LÄNK

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Internetadress Produktinformation, Tiorfan (racecadotril) 10 mg

http://mri.cts-mrp.eu/download/SE_H_1342_003_FinalPI_6of9.pdf

Rekommendation (Grade 1B)

http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade

EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Åsa Andersson 2021-10-18

ePedID: 3336

Fastställare/läkare: Charlotte Höglund 2021-10-18

Versionsnummer, major: 1

Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt

Giltig fr o m: 2021-10-18

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT