

Rasburikas intravenös inf (Fasturtec), stamlösning för vidare spädning

Måste spädas vidare till slutvolym 50 mL enligt steg 2.

Detta är en tvåstegsspädning där slutvolymen alltid blir 50 mL enligt steg 2.

Ska spädas vidare	Fasturtec		Medföljande vätska		SKA SPÄDAS VIDARE
	7,5 mg	+		=	1,5 mg/mL
	1 st		5 mL		5 mL

Beredningsinstruktion: Steg 1: Lös upp pulvret med medföljande spädningsvätska och rotera ampullen försiktigt. Skaka ej. Slutkoncentrationen blir 1,5 mg/mL. Lösningen ska vara klar och färglös.

Individuell spädning

Beredningsinstruktion: Steg 2: Ordinerad dos utifrån kroppsvikt ska spädas vidare med NaCl 9 mg/mL till en sammanlagd volym på 50 mL. Se exempel nedan:

Exempelvolymer av Rasburikas färdigblandad infusionslösning 1,5 mg/mL

Kroppsvikt	Volym vid dos 0,15 mg/kg	Volym vid dos 0,2 mg/kg
1 kg	0,1 mL till 50 mL	0,13 mL till 50 mL
10 kg	1 mL till 50 mL	1,33 mL till 50 mL
25 kg	2,5 mL till 50 mL	3,33 mL till 50 mL
50 kg	5 mL till 50 mL	6,67 mL till 50 mL

Administreringsätt

Intravenös infusion: 30 min

Vanlig indikation och dos

Handläggare/apotekare: Anna Hardmeier 2017-02-07 09:52:06
Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2017-02-07 09:51:14
Källa: www.eped.se
Kontakt: barnlakemedel@karolinska.se

Läkemedelsnummer: 3346
ID/spårnummer: 1920
Giltig fr o m: 2017-02-07 09:51:14
Utskriftsdatum: 2017-02-08

Kontrollera alltid att utskriften kopia är giltig. Ny version kan ha skapats sedan utskriften gjordes.



Rasburikas intravenös inf (Fasturtec), stamlösning för vidare spädning

Profylax och akut behandling av höga urinsyranivåer (hyperurikemi) vid initiering av kemoterapibehandling.

Barn 0 - 17 år: 0,15 - 0,20 mg/kg x 1.

Behandlingstid max 7 dagar

Var god se även riktlinjer för behandling i aktuellt leukemiprotokoll
(NOPHO-ALL 2008).

Hållbarhet preparat:

Fasturtec (registrerad produkt)

- 7,5 mg, Pulver & vätska till inj/inf

Hållbar: Förvaras i kylskåp (2°C-8°C). Får ej frysas. Förvaras i
originalförpackningen. Ljuskänsligt.

- 1,5 mg/mL, Stamlösning

Hållbar: 24 tim kyl, 12 tim rumstemp

Hållbarhet preparat:

Rasburikas färdigblandad infusionslösning

- Färdigblandad infusionslösning är hållbar 24 timmar i kylskåp.

Övrig information

Kompatibilitet: Administrera helst inte rasburikas i samma infart som
kemoterapeutiska medel. Om detta ej är möjligt bör kanalen sköljas med
fysiologisk natriumkloridlösning mellan infusion av kemoterapeutiska medel och
rasburikas.

Kontraindikation: G6PD brist eller andra metabola sjukdomar som kan ge
hemolytisk anemi.

Patienten bör monitoreras för hypersensitivitet.

Referens/Länk

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Rekommendation ,(Grade 2C)

http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade

Lokal länk

Lokal instruktion, begränsad åtkomst

http://eped.sll.sjonet.org/eped_extra/lokalreferens.html#3346

Handläggare/apotekare: Anna Hardmeier 2017-02-07 09:52:06

Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2017-02-07 09:51:14

Källa: www.eped.se

Kontakt: barnlakemedel@karolinska.se

Läkemedelsnummer: 3346

ID/spårnummer: 1920

Giltig fr o m: 2017-02-07 09:51:14

Utskriftsdatum: 2017-02-08

Kontrollera alltid att utskriften kopia är giltig. Ny version kan ha skapats sedan utskriften gjordes.



Rasburikas intravenös inf (Fasturtec), stamlösning för vidare spädning

Substansspecifika uppgifter

rasburikas, V03AF07

Handläggare/apotekare: Anna Hardmeier 2017-02-07 09:52:06
Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2017-02-07 09:51:14
Källa: www.eped.se
Kontakt: barnlakemedel@karolinska.se

Läkemedelsnummer: 3346
ID/spårnummer: 1920
Giltig fr o m: 2017-02-07 09:51:14
Utskriftsdatum: 2017-02-08

Kontrollera alltid att utskriften kopia är giltig. Ny version kan ha skapats sedan utskriften gjordes.

