

Amiodaron intravenös inf 1,5 mg/mL (ex Cordarone)

GLUKOS ska användas för spädning samt spolning före och efter infusionen.

Risk för förväxling, olika styrkor kan finnas.

Ordineras i samråd med kardiolog,

En-stegsspädning:	Amiodaron (ex. Cordarone)	Glukos 50 mg/mL		INJ-INF LÖ
	50 mg/mL			1,5 mg/mL
	1,5 mL	48,5 mL	=	50 mL

En-stegsspädning:	Amiodaron (ex. Cordarone)	Glukos 50 mg/mL		INJ-INF LÖ
	50 mg/mL			1,5 mg/mL
	3 mL	97 mL	=	100 mL

Beredningsinstruktion: Får endast spädas med glukos 50 mg/mL.

Administreringssätt

Intravenös infusion: helst i central infart.

Infusion i perifer ven kan orsaka smärta och inflammation.

Får varken ges tillsammans med eller parallellt med NaCl.

Vanlig indikation och dos

Allvarlig symtomgivande ventrikulär och supraventrikulär takyarytmi i samband med WPW, förmaksfladder/flimmer

Bolusdos: 5 mg/kg under 30 - 120 min

Därefter underhållsdos 7,5 - 15 mikrogram/kg/min under 12 - 24 timmar.

Rimlig dos för barn	1 kg	5 kg	10 kg	50 kg
15 mikrogram/kg/min	0,6 mL/tim	3 mL/tim	6 mL/tim	30 mL/tim
5 mg/kg	3,33 mL	16,7 mL	33,3 mL	167 mL

Hållbarhet preparat:

Amiodaron (ex. Cordarone) (registrerad produkt)

Handläggare/apotekare: Åsa Andersson 2017-11-30 11:26:01

Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2017-12-05 12:02:57

Källa: www.eped.se

Kontakt: barnlakemedel@sl.se

Läkemedelsnummer: 3347

ID/spårnummer: 4014

Giltig fr o m: 2017-12-05 12:02:57

Utskriftsdatum: 2017-12-07

Kontrollera alltid att utskriven kopia är giltig. Ny version kan ha skapats sedan utskriften gjordes.



Amiodaron intravenös inf 1,5 mg/mL (ex Cordarone)

- 50 mg/mL, Injektionsvätska, lösning
Hållbar: Förvaras vid högst 25 C. Förvaras i originalförpackningen.
Ljuskänsligt. Sparas inte efter första uttag.
- 1,5 mg/mL, Injektions-/infusionsvätska, lösning
Hållbar: Ljuskänsligt. 12 tim rumstemperatur.

Övrig information

Ska ordineras i samråd med barnkardiolog.

Amiodarone i koncentration över 2 mg/mL ska administreras i central infart.

Amiodarone ska inte användas om arytmien orsakats av förgiftning, exempelvis med tricykliska antidepressiva.

Innehåller bensylalkohol. I den färdigspädda lösningen är koncentrationen bensylalkohol 0,6 mg/mL. Detta motsvarar per dos:

5 mg/kg amiodaron = 1,8 mg/kg bensylalkohol

Det är oklart vilka mängder bensylalkohol som är fatalt toxiska, men doser över 99 mg/kg/dag har gett "gasping syndrome" hos nyfödda.

Referens/Länk

BNF-C

<http://www.medicinescomplete.com/mc/bnfc/current/>

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Rekommendation ,(Grade 2C)

http://www.essentialmedicineplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade

Substansspecifika uppgifter

Amiodarone hydrochloride, C01BD01

<http://www.fass.se/LIF/substance?substanceId=IDE4POENUACWFVERT1&UserTypeID=0>

Handläggare/apotekare: Åsa Andersson 2017-11-30 11:26:01
Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2017-12-05 12:02:57
Källa: www.eped.se
Kontakt: barnlakemedel@sl.se

Läkemedelsnummer: 3347
ID/spårnummer: 4014
Giltig fr o m: 2017-12-05 12:02:57
Utskriftsdatum: 2017-12-07

Kontrollera alltid att utskriven kopia är giltig. Ny version kan ha skapats sedan utskriften gjordes.

