



Fytomenadion oralt 1 mg

(Vitamin K, NeoKay licens) kapsel

INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

Licenspreparat NeoKay kapsel 1 mg

Alternativa preparat är Konaktion Novum injektionslösning 10 mg/mL (för peroralt bruk) och licenspreparat Ka-Vit orala droppar 20 mg/mL, se andra instruktioner.

ADMINISTRERINGSSÄTT

Kapseln kan öppnas genom att den smala spetsen klipps bort. Därefter kan innehållet tryckas ut och administreras.

Oralt

Enteralt i sond

ÖVRIG INFORMATION

Peroral profylax med vitamin K ska avbrytas om barnet i huvudsak (över 50 %) får sin näring/uppfödning via komjölsbaserad modersmjölkersättning som är berikad med vitamin K.

Peroral profylax med vitamin K kan vara otillräcklig hos barn med underliggande leversjukdom/kolestas eller malabsorption eller om modern behandlas med antikoagulantia, antiepileptika eller antituberkulostatika. Fortsatt behandling bör baseras på koagulationsstatus.

Doseringen för förebyggande av blödning hos nyfödda i denna instruktion är från Svenska Neonatalföreningens riktlinje, samt andra källor, och skiljer sig därför från doseringen i FASS.

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

NeoKay (licensprodukt)

1 mg, Kapsel, mjuk

HÅLLBAR: Förvaras i högst 25 °C, får ej frysas. Förvaras i originalförpackningen.

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Förebyggande av vitamin K-beroende blödning hos fullgångna nyfödda, endast i de fall intramuskulär/intravenös injektion inte kan ges:

- misstänkt/diagnostiserad blödarsjuka

- vårdnadshavare önskar peroralt alternativ

Fullgångna nyfödda:

Startdos: engångsdos 2 mg (2 kapslar)

Denna dos ges så snart som möjligt under första levnadsdygnet.

Därefter 1 mg (1 kapsel) 1 gång per vecka i 3 månader.

Förvärvad vitamin K-brist, inkl. vid leversjukdom, neonatal kolestas, neonatal hypoprotrombinemi

Nyfödda: 1 mg/kg x 1

Barn 1 mån - 18 år: 1 mg/kg x 1, max 10 mg

REFERENS/LÄNK

Micromedex

NeoFax

Rekommendation ,(Grade 1C)

http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade

Summary of Product Characteristics (SPC) Neokay capsules 1 mg

<https://www.medicines.org.uk/emc/product/2677/smpc>

Svenska Barnläkarföreningen Svenska Neonatalföreningen - Nationella riktlinjer för vitamin K profylax

<http://neo.barnlakarforeningen.se/riktlinjer-varldprogram/>

LOKAL LÄNK

Lokal instruktion, begränsad åtkomst

http://eped.sll.sjunet.org/eped_extra/lokalreferens.html#3354

EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Ingehla Rydén 2018-10-09

ePedID: 3354

Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2018-10-18

Versionsnummer, major: 1

Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt

Giltig fr o m: 2018-10-18

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT