



Aciklovir oralt

(ex Zovirax) tabletter

INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

Tabletter 200, 400 och 800 mg (ex Aciclovir STADA)
Tabletter 200 och 400 mg (Aciclovir Sandoz)
Tablett 400 mg (ex Zovirax)

Aciklovir finns även som oral suspension 40 mg/mL resp 80 mg/mL, se andra instruktioner.

ADMINISTRERINGSSÄTT

Tabletter Aciclovir Sandoz kan delas i två lika stora doser.
Alla tabletter kan krossas eller lösas upp i vatten för att underlätta nedsväljning eller för att ges i sond.

Oralt

Enteralt i sond

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

Aciklovir (registrerad produkt)

200 mg, Tablett

HÅLLBAR: Förvaras i rumstemperatur, gäller alla styrkor och fabrikat.

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Viktigt med adekvat hydrering, särskilt vid behandling med höga doser.

Herpes simplex, behandling

Barn 1 - 23 mån: 100 mg x 5

Barn 2 - 18 år: 200 mg x 5

Första dosen bör tas så tidigt som möjligt i sjukdomsförloppet. Dosen ges var 4:e timme under den vakna delen av dygnet.

Behandlingstid: 5 - 10 dagar beroende på svårighetsgrad

Herpes simplex, profylax till patienter med nedsatt immunförsvar

Barn 1 - 23 mån: 100 - 200 mg x 4

Barn 2 - 18 år: 200 - 400 mg x 4

Dosen ges var 5:e timme under den vakna delen av dygnet.

Vid långtidsbehandling, vanligen 12 mån, ges lägre dos:

Barn under 40 kg: 7,5 mg/kg x 2

Barn från 40 kg: 400 mg x 2

Varicella zoster/Herpes zoster (vattkoppor/bältros)

Barn 1 mån - 12 år: 20 mg/kg x 4, max 800 mg x 4

Dosen ges var 5:e timme den vakna delen av dygnet.

Barn 13 - 18 år: 800 mg x 5

Dosen ges var 4:e timme den vakna delen av dygnet.

Varicella zoster: behandling ska sättas in inom 24 tim från blåsdebut.

Herpes zoster: behandling ska sättas in snarast, senast inom 72 tim från blåsdebut.

Behandlingstid: vanligen 5 - 7 dagar, men minst till 2 dagar efter att det har bildats krustor av blåsorna.



Aciklovir oralt (ex Zovirax) tabletter



ÖVRIG INFORMATION

Behandling av Varicella zoster/Herpes zoster hos patienter med normalt immunförsvar ska initieras om ett allvarligt sjukdomsförlopp kan befaras.

Aciklovir absorberas ofullständigt från gastrointestinalkanalen. Absorptionen sjunker med stigande doser och ligger mellan ca 9 - 20 %.

REFERENS/LÄNK

BNF-C

<http://www.medicinescomplete.com/mc/bnfc/current/>

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Internetadress RAV, referensgruppen för antiviral terapi - Farmakoterapi vid herpes simplex-, varicella- och herpes zosterinfektioner

<https://www.sls.se/rav/rekommendationer/herpes-simplex-och-varicella-zoster-virus/>

Rekommendation (Grade 1C)

http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade

LOKAL LÄNK

Lokal instruktion, begränsad åtkomst

http://eped.sll.sjunet.org/eped_extra/lokalreferens.html#3358

EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Ingehla Rydén 2020-08-07

ePedID: 3358

Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2020-08-07

Versionsnummer, major: 2

Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt

Giltig fr o m: 2020-08-07

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT