



Teikoplanin intravenös inf/inj 67,7 mg/mL

(ex Targocid) spädning från 200 mg

EN-STEGSSPÄDNING

Targocid		Sterilt Vatten		INJ-INF LÖ
200 mg	+		=	67,7 mg/mL
1 st		3,2 mL		3,2 mL

Beredningsinstruktion:

TTillsätt 3,2 mL sterilt vatten långsamt och lös upp pulvret försiktigt. Om det bildas skum bör lösningen stå i cirka 15 minuter.

Från vissa tillverkare medföljer sterilt vatten.

Flaskan är överfylld med pulver och därför blir den beredda lösningens koncentration 67,7 mg/mL efter tillsats av 3,2 mL.

ARBETSMILJÖ

Allergisk, hantera enligt lokal rutin, -

ADMINISTRERINGSSÄTT

Om teikoplanin ska ges som infusion ska ordinerad dos av det upplösta pulvret spädas vidare med natriumklorid 9 mg/mL eller glukos 50 mg/mL.

Intravenös injektion: Ges som långsam injektion under 3 - 5 minuter. Till nyfödda bör teikoplanin ges som infusion.

Allvarliga livshotande överkänslighetsreaktioner har rapporterats. Om läkemedlet ges som intravenös infusion minskar risken för allergiska reaktioner.

Intravenös infusion: Ges under 30 minuter.

RIMLIG DOS för Teikoplanin intravenös inf/inj 67,7 mg/mL

	1 kg	5 kg	10 kg	50 kg
6 mg/kg	-	0,44 mL	0,89 mL	-
8 mg/kg	0,12 mL	0,59 mL	1,18 mL	-
10 mg/kg	-	-	1,48 mL	7,39 mL

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Allvarliga grampositiva infektioner inklusive endokardit samt infektioner orsakade av *Staphylococcus aureus*.

Ordineras i samråd med infektionsspecialist.

Nyfödda

Laddningsdos: 16 mg/kg

Underhållsdos: 8 mg/kg x 1

Barn 1 mån - 12 år

Laddningsdos: 10 mg/kg, var 12:e timme, max 400 mg. Ge 3 doser, sedan underhållsdos

Underhållsdos: 6 - 10 mg/kg x 1, max 400 mg

Barn 13 - 18 år

Laddningsdos: 400 - 800 mg, var 12:e timme, upprepas 3 - 5 gånger

Underhållsdos: 6 - 12 mg/kg x 1

För patienter med vikt från ca 25 - 35 kg, beroende av dos, rekommenderas teikoplanin 400 mg, se annan instruktion.

ÖVRIG INFORMATION

Doseringen bör anpassas efter njurfunktionen.

I produktresumen för Targocid anges att pulvret ska lösas i 3,14 mL vatten för injektionsvätska. I denna beredningsinstruktion anges 3,2 mL, enligt tidigare produktresumé för Targocid samt gällande produktresumé för Teicoplanin Sandoz, då detta är en mer lätthanterlig volym.

Vid underhållsbehandling bör kontroll av dalkoncentrationer av teikoplanin i serum utföras minst en gång per vecka.





Teikoplanin intravenös inf/inj 67,7 mg/mL

(ex Targocid) spädning från 200 mg

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

Targocid (registrerad produkt)

67,7 mg/mL, Injektions-/infusionsvätska, lösning

HÅLLBAR: färdigberedd injektionslösning och spädd infusionslösning 24 timmar i kylskåp.

REFERENS/LÄNK

BNF-C

<http://www.medicinescomplete.com/mc/bnfc/current/>

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Pediatric Dosage Handbook

Rekommendation , (Grade 2B)

http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade

Summary of Product Characteristics (SPC) Teicoplanin Sandoz

<https://lakemedelsverket.se/LMF/Lakemedelsinformation/?nplid=20110405000025&type=product>

EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Ranaa El-Edelbi 2020-01-14

ePedID: 3378

Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2020-01-16

Versionsnummer, major: 3

Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt

Giltig fr o m: 2020-01-16

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT