



Vankomycin oralt 50 mg/mL

(ex Extempore) oral lösning

INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

Alt. 1: Oral lösning 50 mg/mL (extempore)

Alt. 2: Spädning från pulver till infusionsvätska 500 och 1000 mg, för ORALT bruk - vid brist på Alt. 1

EN-STEGSSPÄDNING

Alt. 2

Vankomycin		Sterilt Vatten		ORAL LÖSN
500 mg	+		=	50 mg/mL
1 st		10 mL		10 mL

EN-STEGSSPÄDNING

Alt. 2

Vankomycin		Sterilt Vatten		ORAL LÖSN
1000 mg	+		=	50 mg/mL
1 st		20 mL		20 mL

Beredningsinstruktion:

Märk spädning "för ORALT bruk" för att undvika förväxling.

ARBETSMILJÖ

Allergirisk, hantera enligt lokal rutin, -

ADMINISTRERINGSSÄTT

Oralt

Enteralt i sond

RIMLIG DOS för Vankomycin oralt 50 mg/mL

	1 kg	5 kg	10 kg	50 kg
10 mg/kg	-	1 mL	2 mL	10 mL

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Enterokolit orsakad av stafylokocker

Barn 1 mån - 18 år: 10 mg/kg x 4, max 2 g/dygn

Behandlingstid: 10 dagar

Diarré orsakad av clostridium difficile (CDI)

Barn 1 mån - 18 år: 10 mg/kg x 4, max 2 g/dygn

Behandlingstid: 10 dagar

I produktresumén anges lägre dos vid icke-allvarlig CDI för barn över 12 år, i internationell barnlitteratur anges främst dosen ovan.

ÖVRIG INFORMATION

Det sker normalt ingen absorption av vankomycin i tarmen. Absorptionen brukar vara förhöjd hos patienter med inflammerad tarm.

Vankomycinlösning har lågt pH (2,5 - 4,5) och kan därför vara irriterande på slemhinnor. Detta kan undvikas genom att administrera läkemedlet via sond.

För vård i hemmet ska läkemedlet beställas extempore.





Vankomycin oralt 50 mg/mL

(ex Extempore) oral lösning

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

Vankomycin (från registrerad produkt)

500 mg, Pulver och vätska till infusionsvätska, lösning

HÅLLBAR: Förvaras vid högst 25 °C i ytterförpackningen, ljuskänsligt. Gäller även 1000 mg.

50 mg/mL, Oral lösning

HÅLLBAR: Efter iordningställande: 24 tim i kylskåp. Märk spädning "för ORALT bruk".

Vankomycin (Extempore) (extempore - ej lagervara)

50 mg/mL, Oral lösning

HÅLLBAR: Om apoteksberedd: öppnad hållbar 4 veckor i kylskåp, efter första uttag 7 dagar i kylskåp.

REFERENS/LÄNK

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Handbook of Drug Administration via Enteral Feeding Tubes

Micromedex

NeoFax

Pediatric Dosage Handbook

Personlig kontakt Apoteket Produktion och Laboratorier, orderservice

PubMed PMID McDonald LC et al. Clinical Practice Guidelines for Clostridium difficile Infection in Adults and Children: 2017 Update by the Infectious Diseases Society of America (IDSA) and Society for Healthcare Epidemiology of America (SHEA).

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29462280>

Rekommendation ,(Grade 2C)

http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade

EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Anna Hardmeier 2020-03-04

ePedID: 3426

Fastställare/läkare: Charlotte Höglund 2020-03-24

Versionsnummer, major: 3

Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt

Giltig fr o m: 2020-03-24

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT