



Vaccin: Rotarix oralt

mot rotavirus, oral suspension

Kontraindicerat till underburen född före v 27+0, vid tidigare invagination, allvarlig immunbrist eller överkänslighet mot sackaros, se Övrig information.

Smittrisk till immunsupprimerade patienter, se Övrig information.

Senarelägg vaccineringen vid pågående diarré, kräkning och/eller allvarlig febersjukdom.

INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

Levande försvagat vaccin i endosbehållare

1 dos = 1,5 mL

INGEN SPÄDNING

ORAL SUSP
1 dos
1,5 mL

ADMINISTRERING

Oralt:

Endosbehållaren kan tas ut ur kylskåpet 15 min innan administreringen. Tryck ut vätskan från endosbehållaren direkt i barnets mun mot kindens insida. Upprepade tryck på behållaren kan behövas för att få ut allt vaccin.

Om barnet spottar ut eller kräks upp dosen ska inte ny dos ges.

Vaccin som spills eller spottas ut ska torkas bort med desinfektionsmedel. Händer tvättas med tvål och vatten och handsprit.

Suspensionen ska vara klar och färglös.

Enligt författning HSLF-FS 2017:37 ange batchnummer i journalhandling.

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Första dosen ska ges före 12 veckors ålder, annars ska barnet inte alls vaccineras mot rotavirus.

Grundvaccination enligt allmänna vaccinationsprogrammet

Barn födda från gestationsvecka 27+0

Dos: 1,5 mL/dostillfälle

Dos 1: vid 6 v ålder (senast före 12 v ålder)

Dos 2: vid 3 mån ålder (tidigast 4 v efter dos 1, senast före 16 v ålder)

Ökad risk för apnéer hos barn födda före graviditetsvecka 29. Beakta behov av andningsövervakning under 48 - 72 tim efter vaccinationen.

De strikta åldersangivelserna ovan anges i vaccinationsprogrammet för att i möjligaste mån minimera risken för tarminvagination. Enligt godkänd produktresumé kan dock sista dosen, vid behov, ges senast vid 24 veckors ålder.

ÖVRIG INFORMATION

Relativa kontraindikationer är missbildning i mag-tarmkanalen som kan vara predisponerande för invagination, tidigare bukoperation, pågående utredning för mag-tarmsjukdom, behandling med immunsupprimerande läkemedel, fruktosintolerans, glukos-galaktosmalabsorption eller sukras-isomaltasbrist.

Rotarix utsöndras till viss del via avföringen vilket kan medföra risk för smitta av anhöriga, medpatienter eller andra med nära kontakt och som har nedsatt immunförsvar. Risken är dock låg och vaccinering av inläggande patient kan genomföras på neonatalavdelning. Viktigt att följa gällande hygienrutiner och enkelrum rekommenderas.

Rotavirusvaccin är levande försvagade vaccin och kan ges i kombination med andra levande försvagade vacciner och/eller inaktiverade vacciner. Kombination med vaccin mot Covid-19 rekommenderas generellt inte, men kan ges om situationen kräver det. Se även referens Janusinfo.

Rotarix är helt utbytbar mot RotaTeq. Om en dos RotaTeq är given ges två doser Rotarix. Om två doser RotaTeq är givna ges en dos Rotarix.





Vaccin: Rotarix oralt mot rotavirus, oral suspension

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

Rotarix (registrerad produkt)

1 dos, Oral suspension

Förvaras i kylskåp. Får ej frysas. Förvaras i originalförpackningen, ljuskänsligt.
Används direkt när endosbehållaren har öppnats.

REFERENS/LÄNK

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Internetadress Folkhälsomyndigheten - Barnvaccinationsprogrammet

<https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/vaccinationer/nationella-vaccinationsprogram/barnvaccinationsprogram/>

Internetadress Folkhälsomyndigheten - Vaccin mot rotavirus

<https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/vaccinationer/vacciner-a-o/rotavirus/>

Internetadress Folkhälsomyndigheten - Vaccination av för tidigt födda barn

<https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/vaccinationer/rekommendationer-for-vaccination/vaccination-av-prematura-barn/>

Internetadress Folkhälsomyndigheten - Vaccination mot rotavirus till sjukhusvårdade barn på neonatalavdelning

<https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/vaccinationer/rekommendationer-for-vaccination/vaccination-mot-rotavirus-pa-neonatalavdelning/>

Internetadress Folkhälsomyndigheten - Vaccinationsprogram för barn. En kunskapsöversikt för hälsovårdspersonal.

<https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/v/vaccination-av-barn-det-svenska-vaccinationsprogrammet-en-kunskapsöversikt-for-halsovardspersonal/>

janusinfo.org Allmän information om vaccinationer

<https://janusinfo.se/behandling/expertgruppsutlatanden/vaccinationer/>

Rekommendation , (Grade 2A)

<https://www.gradeworkinggroup.org/>

Svenska Barnläkarföreningen Svenska Neonatalföreningen - Vaccinationer på neonatalavdelning

<https://neo.barnlakarforeningen.se/riktlinjer-varldprogram/infektion/>

LOKAL LÄNK

Lokal instruktion, begränsad åtkomst

http://eped.sll.sjunet.org/eped_extra/lokalreferens.html#3427

EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Ingehla Rydén

ePedID: 3427

Fastställare/läkare: Charlotte Höglund

Versionsnummer, major: 5

Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt

Giltig fr o m: 2023-12-05

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT