



Diazepam oralt

(ex Stesolid) tabletter

INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

Tablett 2, 5 och 10 mg (ex Stesolid)

ADMINISTRERING

Tabletter Diazepam Orifarm samt Stesolid har brytskåra, men kan endast delas för att underlätta nedsväljning inte för att ge halv dos.

Tabletter Diazepam Accord saknar brytskåra.

Oralt:

Vid sväljsvårigheter kan tablettorna krossas och/eller slamas upp i vatten i direkt anslutning till administreringen. Tabletten kan vara svårlöslig, upplösningen kan ta några minuter.

Enteralt:

Tablettorna kan krossas och slamas upp i vatten i direkt anslutning till administreringen. Tabletten kan vara svårlöslig, upplösningen kan ta några minuter.

Tid till effekt: 15 - 30 min, effekten varar 1 - 3 tim.

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

Diazepam (registrerad produkt)

Tablett

Förvaras i rumstemperatur. Gäller samtliga styrkor och fabrikat.

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Kan ge andningsdepression, framförallt vid högre doser.

Sedering inför procedur

Barn 6 mån - 18 år: 0,2 - 0,4 mg/kg, max 10 mg/DOS

ÖVRIG INFORMATION

Antidot flumazenil (f.d Lanexat). Flumazenil är olämpligt att ge till patient med epilepsi/kramper då den plötsliga antagonistiska effekten i sig kan orsaka kramper.

REFERENS/LÄNK

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Handbook of Drug Administration via Enteral Feeding Tubes

Läkemedelsverket Behandlingsrekommendationer, Behandling av barn i samband med smärtsamma procedurer i hälso- och sjukvård

www.lakemedelsverket.se/smartsam-procedur

Rekommendation , (Grade 2C)

<https://www.gradeworkinggroup.org/>

UpToDate

<http://www.uptodate.com>

EPED CENTRAL

Handläggare/apotekare: Ingehla Rydén

ePedID: 3434

Fastställare/läkare: Christiane Garnemark

Versionsnummer, major: 2

Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt

Giltig fr o m: 2025-01-08

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT