



Diazepam oralt

(ex Stesolid) tabletter

INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

Tablett 2, 5 och 10 mg (ex Stesolid)

ADMINISTRERING

Tabletter Stesolid har brytskåra och kan delas i två lika stora doser.
Tabletter Diazepam Orifarm har brytskåra, men kan endast delas för att underlätta nedsväljning.
Tablett Diazepam Accord saknar brytskåra.

Oralt:

Vid sväljsvårigheter kan tabletterna krossas och/eller slamas upp i vatten i direkt anslutning till administreringen. De kan dock vara svårösliga, upplösningen kan ta några minuter.

Entertalt:

Tablettorna kan krossas och slamas upp i vatten i direkt anslutning till administreringen. De kan dock vara svårösliga, upplösningen kan ta några minuter.

Tid till effekt: 15 - 30 min, effekten varar 1 - 3 tim.

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

Diazepam (registrerad produkt)

Tablett

Förvaras i rumstemperatur. Gäller samtliga styrkor och fabrikat.

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Kan ge andningsdepression, framförallt vid högre doser.

Sedering inför procedur

Barn 6 mån - 18 år: 0,2 - 0,4 mg/kg, max 10 mg

ÖVRIG INFORMATION

Antidot flumazenil (f.d Lanexat). Flumazenil är olämpligt att ge till patient med epilepsi/kramper då den plötsliga antagonistiska effekten i sig kan orsaka kramper.

REFERENS/LÄNK

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Handbook of Drug Administration via Enteral Feeding Tubes

Läkemedelsverket Behandlingsrekommendationer, Behandling av barn i samband med smärtsamma procedurer i hälso- och sjukvård

www.lakemedelsverket.se/smartsam-procedur

Rekommendation , (Grade 2C)

<https://www.gradeworkinggroup.org/>

UpToDate

<http://www.uptodate.com>

EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Ingehla Rydén

ePedID: 3434

Fastställare/läkare: Christiane Garnemark

Versionsnummer, major: 2

Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt

Giltig fr o m: 2026-02-03

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT