



Natriumklorid rektalt 9 mg/mL

Infusionsvätska för rektalt bruk.

INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

Infusionsvätska, lösning 9 mg/mL, används REKTALT

INGEN SPÄDNING

REKTALLÖSN
9 mg/mL
flera volymer finns

ADMINISTRERING

Rektalt:

Bör värmas till kroppstemperatur i ett vattenbad före administrering och ges med fördel med Nelatonkateter, Ch 12 - 16, mindre storlek rekommenderas om barnet är prematurt.

Fyll katetern med natriumklorid 9 mg/mL. Smörj in anus och katetern med glidslem eller vitt vaselin innan den försiktigt förs in i ändtarmen ca 3 - 10 cm beroende på barnets ålder, forcera aldrig. Spruta in vätskan långsamt. Om det tar stopp spola 5 mL samtidigt som katetern förs in. Forcera aldrig!

Spola långsamt i omgångar, till nyfödd eller prematurfödd ca 5 - 10 mL/gång, till spädbarn ca 10 - 30 mL/gång. Mellan varje insprutning får vätskan passivt rinna ut genom katetern. Om barnet krystar koppla loss sonden och släpp ut vätskan. Spola gärna tills klart utbyte. Följ lokala rutiner.

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

Natriumklorid (registrerad produkt)

9 mg/mL, Injektion/infusionsvätska, för rektalt bruk

Hållbar 24 tim i kylskåp, 12 tim i rumstemperatur.

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Lavemang får aldrig ges till patient med oklara bukbesvär och ges alltid efter läkarordination.

Ordineras i samråd med neonatolog eller barnkirurg.

Lavemang vid tömningssvårigheter (t ex utebliven mekoniumavgång) (erfarenhetsbaserad behandling)

Nyfödda: 2 - 5 mL/kg

Barn 1 mån - 1 år: 5 - 10 mL/kg

Forcera aldrig.

Totalmängden för spädbarn vanligen max 100 mL.

Lavemang för stimulering av tarmen (t ex efter kirurgiskt ingrepp vid medfödd missbildning som tarmatresi/bukväggsdefekt)

Nyfödda: 2 - 5 mL/kg

Barn 1 mån - 1 år: 5 - 10 mL/kg

Forcera aldrig.

5 mL kan lämnas kvar i upplösande syfte.

Hirschsprungs sjukdom (misstänkt eller bekräftad)

Nyfödda: 2 - 5 mL/kg

Barn 1 mån - 1 år: 5 - 10 mL/kg eller enligt individuell regim

Lavemang ges vanligen 2 - 3 gånger dagligen, eller vid behov, tills utredningen är klar och barnet kirurgiskt korrigerat.



Natriumklorid rektalt 9 mg/mL



REFERENS/LÄNK

Internetadress VGR, Alfresco, DSBS - Lavemangsbehandling till nyfödd barn

<https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/SOFIA/SU9774-1570060579-394/SURROGATE/Lavemang%20-%20nyf%c3%b6dd.pdf>

Internetadress VGR, Alfresco, NÅL - Grov vägledning för handläggning av förstoppning hos spädbarn under 1 års ålder

<https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/SOFIA/NU10035-986315719-98/SURROGATE/F%c3%b6rstoppning%20sp%c3%a4dbarn.pdf>

Internetadress Vårdprogram Hirschsprungs Sjukdom, Skånes Universitetssjukhus Lund

<https://vardgivare.skane.se/siteassets/1.-vardriktlinjer/lokala-riktlinjer/barnkirurgi-sus---fillistning/hirschsprungs-sjukdom-hd.pdf>

Rekommendation , (Grade 2D)

<https://www.gradeworkinggroup.org/>

EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Åsa Andersson

ePedID: 3451

Fastställare/läkare: Christiane Garnemark

Versionsnummer, major: 1

Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt

Giltig fr o m: 2025-07-01

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT