

Flukloxacillin oralt (ex Heracillin) tabletter

Instruktionen gäller för: Tabletter 125 mg, 500 mg, 750 mg respektive 1 g

Arbetsmiljö Allergisk, hanteras enl lokala läkemedelshanteringsinstruktioner, Penicilliner kan ge allergi vid inandning, hudkontakt och förtäring. Långvarig eller upprepad inandning eller hudkontakt kan ge allergiska reaktioner

Administreringssätt

Oralt

Bäst effekt fås om doserna tas mellan måltider (minst 30 minuter före måltid).

Vanlig indikation och dos

Bakteriell infektion med bakterier känsliga för flukloxacillin, fr.a. infektioner i lungor, hud och/eller mjukdelar inkl. sårinfektioner

Nyfödda:

Dag 0 - 7: 25 mg/kg x 2

Dag 8 - 21: 25 mg/kg x 3

Dag 22 - 28: 25 mg/kg x 4

Barn 1 mån - 18 år: 10 - 17 mg/kg x 3, max 750 mg x 3

Barn över 2 år: dosen kan ökas till 20 - 33 mg/kg x 3, max 1 g x 3, vid infektioner i leder och skelett samt vid allvarliga infektioner i lungor, hud eller mjukdelar.

Behandlingstid: vanligen 7 - 10 dagar

Uppföljande peroral behandling av skelettinfektioner så som osteomyelit, septisk artrit, spondylodiskit orsakade av Staphylococcus aureus

Barn 1 mån - 18 år: 25 mg/kg x 4, max 4 (- 6) g/dygn

Total rekommenderad behandlingstid, inkl. inledande intravenös behandling, i okomplicerade fall: 4 veckor

Handläggare/apotekare: Ingehla Rydén 2017-08-24 15:17:38
Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2017-08-25 12:02:46
Källa: www.eped.se
Kontakt: barnlakemedel@sll.se

Läkemedelsnummer: 3455
ID/spårnummer: 3599
Giltig fr o m: 2017-08-25 12:02:46
Utskriftsdatum: 2017-08-25

Kontrollera alltid att utskriven kopia är giltig. Ny version kan ha skapats sedan utskriften gjordes.



Flukloxacillin oralt (ex Heracillin) tabletter

Luftvägsinfektion vid Cystisk fibros

Barn 1 mån - 18 år: 25 mg/kg x 4 alt 33 mg/kg x 3, max 4,5 g/dygn

Referens/Länk

BNF-C

<http://www.medicinescomplete.com/mc/bnfc/current/>

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Internetadress Kloka Listan

<http://klokalistan.janusinfo.se/2017/infektioner/>

Rekommendation ,(Grade 1B)

http://www.essentialvidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade

Lokal länk

Lokal instruktion, begränsad åtkomst

http://eped.sll.sjonet.org/eped_extra/lokalreferens.html#3455

Substansspecifika uppgifter

Flucloxacillin, J01CF05

<http://www.fass.se/LIF/substance?substanceId=IDE4POE1U9VI9VERT1&UserTypeId=0>

Handläggare/apotekare: Ingehla Rydén 2017-08-24 15:17:38
Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2017-08-25 12:02:46
Källa: www.eped.se
Kontakt: barnlakemedel@sll.se

Läkemedelsnummer: 3455
ID/spårnummer: 3599
Giltig fr o m: 2017-08-25 12:02:46
Utskriftsdatum: 2017-08-25

Kontrollera alltid att utskriven kopia är giltig. Ny version kan ha skapats sedan utskriften gjordes.

