



Alprostadi intravenös inf 2 mikrog/mL

(ex Prostivas)

Tvåstegsspädning (alt. 4)

INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

Alt. 1 - 3: enstegsspädning från alprostadi 0,5 mg/mL

Alt. 4: tvåstegsspädning från alprostadi 0,5 mg/mL

EN-STEGSSPÄDNING Alt. 1

Alprostadi		NaCl 9 mg/mL alt Glukos 50	INF
0,5 mg/mL	+	mg/mL	2 mikrog/mL
0,2 mL		49,8 mL	50 mL

EN-STEGSSPÄDNING Alt. 2

Alprostadi		NaCl 9 mg/mL alt Glukos 50	INF
0,5 mg/mL	+	mg/mL	2 mikrog/mL
0,4 mL		100 mL	100,4 mL

Beredningsinstruktion:

Infusionspåsar är överfyllda. Överfyllnadsvolymer skiljer sig mellan olika tillverkare och påsvolymer. Slutkoncentrationen i en 100 mL påse blir ca 1,7 - 2,1 mikrog/mL.

EN-STEGSSPÄDNING Alt. 3

Alprostadi		NaCl 9 mg/mL alt Glukos 50	INF
0,5 mg/mL	+	mg/mL	2 mikrog/mL
1 mL		250 mL	251 mL

Beredningsinstruktion:

Infusionspåsar är överfyllda. Överfyllnadsvolymer skiljer sig mellan olika tillverkare och påsvolymer.

Slutkoncentrationen i en 250 mL påse blir ca 1,8 - 2 mikrog/mL.

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Ordineras i samråd med kardiolog eller neonatolog.

Akutbehandling, ductusberoende hjärtfel

Startdos: 0,05 mikrog/kg/min i ca 15 - 30 min tills effekt.

Vid otillräcklig effekt: öka dosen till 0,1 mikrog/kg/min.

Doser över 0,1 mikrog/kg/min behöver sällan användas, även om doser upp till 0,4 mikrog/kg/min finns beskrivet i litteraturen.

Sänk därefter dosen stegvis till lägsta möjliga infusionshastighet vanligen 0,01 - 0,025 mikrog/kg/min.

Ductusberoende hjärtfel

0,01 - 0,025 mikrog/kg/min

ÖVRIG INFORMATION

Alprostadi, framförallt höga doser, kan ge apnéer, takykardi, bradykardi, blodtrycksfall och temperaturstegring.

I produktresumén anges att produkten är hållbar 8 tim men enligt andra källor är produkten stabil 24 tim eller längre. Baserat på Svensk läkemedelsstandard och mikrobiologisk hållbarhet anges 12 tim i rumstemperatur och 24 tim kylskåp som hållbarhet för denna produkt. För att minska risken för infektioner och effektförlust vid byte av infusion finns stora vinster med att byta mer sällan än var 8:e timme.





Alprostadil intravenös inf 2 mikrog/mL

(ex Prostivas)

TVÅ-STEKSPÄDNING Alt. 4

Steg 1	Alprostadil 0,5 mg/mL 1 mL	+	NaCl 9 mg/mL alt Glukos 50 mg/mL 24 mL	=	Stamlösning 20 mikrog/mL 25 mL
Steg 2	Stamlösning 20 mikrog/mL 5 mL	+	NaCl 9 mg/mL alt Glukos 50 mg/mL 45 mL	=	INF 2 mikrog/mL 50 mL

ADMINISTRERINGSSÄTT

Intravenös infusion (kontinuerlig): Ska infunderas jämnt utan avbrott.

Patienten bör ha två fungerande infarter, ifall byte av infusionsinfart behöver ske omgående.

Kan ges i perifer venkateter (PVK) och central venkateter (CVK).

RIMLIG DOS för Alprostadil intravenös inf 2 mikrog/mL

	1 kg	5 kg	10 kg	50 kg
0,01 mikrog/kg/min	0,3 mL/tim	1,5 mL/tim	3 mL/tim	-
0,05 mikrog/kg/min	1,5 mL/tim	7,5 mL/tim	15 mL/tim	-

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

Alprostadil (registrerad produkt)

0,5 mg/mL, Koncentrat till infusionsvätska, lösning

HÅLLBAR: Förvaras i kylskåp. Bruten ampull får ej sparas, används direkt.

2 mikrog/mL, Infusionsvätska, lösning

HÅLLBAR: Efter iordningställande: 24 tim i kylskåp, 12 tim i rumstemperatur.

Alternativt kan infusion pågå 24 tim efter iordningställande om bedömning eller utvärdering utförts enligt Svensk läkemedelsstandard, se referens

Hållbarhetsinformation.

20 mikrog/mL, Stamlösning

HÅLLBAR: Får ej sparas pga förväxlingsrisk.

REFERENS/LÄNK

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Internetadress ePed - Hållbarhetsinformation

<http://eped.se/hallbarhet/>

Pediatric Dosage Handbook

Pediatric Injectable Drugs

Rekommendation , (Grade 1B)

http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade

Trissel Book on Injectable Drugs

LOKAL LÄNK

Lokal instruktion, begränsad åtkomst

http://eped.sll.sjunet.org/eped_extra/lokalreferens.html#4457

EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Anna Hardmeier 2020-01-10

ePedID: 4457

Fastställare/läkare: Charlotte Höglund 2020-01-15

Versionsnummer, major: 4

Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt

Giltig fr o m: 2020-01-15

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT