



Linezolid oralt 600 mg

(ex Zyvoxid) tablett

Till följd av tabletternas styrka är dessa endast lämpliga att ge till barn från 60 kg. Tabletterna är inte delbara. För mindre barn rekommenderas oral suspension, se annan instruktion.

ARBETSMILJÖ

Allergisk, hantera enligt lokal rutin, -

ADMINISTRERINGSSÄTT

Tabletterna ska sväljas hela.

Oralt

Enteralt i sond: Använd oral suspension, se annan instruktion.

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

Linezolid (registrerad produkt)

600 mg, Tablett

HÅLLBAR: Förvaras i rumstemperatur.

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Ska doseras i hela tabletter och kan ges till barn från 60 kg. Vid behov av annan dosering rekommenderas oral suspension, se annan instruktion.

Bör ordinerars i samråd med infektionsspecialist.

Bakteriell infektion med bakterier känsliga för linezolid, exempelvis med vankomycinresistenta kocker

Barn från 60 kg: 600 mg x 2

Blodstatus bör kontrolleras minst 1 gång per vecka.

Behandlingstid: vanligen 10 - 14 dagar

REFERENS/LÄNK

BNF-C

<http://www.medicinescomplete.com/mc/bnfc/current/>

FASS

<http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0>

Internetadress RAF, Referensgruppen för antibiotikafrågor – Antibiotikakompendium

<https://www.sls.se/raf/lakemedel/antibiotikakompendium/>

Läkemedelsverket Behandlingsrekommendationer, Sjukhusförvärd pneumoni

<https://lv.se/pneumoni>

Micromedex

NeoFax

Rekommendation (Grade 2C)

http://www.essentialvidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade

EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Ingehla Rydén 2020-05-05

ePedID: 4468

Fastställare/läkare: Charlotte Höglund 2020-05-06

Versionsnummer, major: 1

Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt

Giltig fr o m: 2020-05-06

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT