



Alteplas intravenös inf 1 mg/mL

(Actilyse)

EN-STEIGSSPÄDNING

Actilyse		Medföljande vätska		INF
10 mg				1 mg/mL
1 st	+	10 mL	=	10 mL

EN-STEIGSSPÄDNING

Actilyse		Medföljande vätska		INF
20 mg				1 mg/mL
1 st	+	20 mL	=	20 mL

EN-STEIGSSPÄDNING

Actilyse		Medföljande vätska		INF
50 mg				1 mg/mL
1 st	+	50 mL	=	50 mL

Beredningsinstruktion:

Ska iordningställas med medföljande vätska.

Följ instruktionen i bipacksedeln.

Rotera flaskan försiktigt vid upplösning av pulvret. Skaka inte, eftersom det kan leda till skumbildning.

ARBETSMILJÖ

Biologiskt läkemedel, hantera enligt lokal rutin, -

ADMINISTRERINGSSÄTT

Intravenös infusion: ges under 4 - 12 timmar.

VANLIG INDIKATION OCH DOS

Trombolys

Barn: 0,1 - 0,6 mg/kg/tim, ges under 4 - 12 timmar.

RIMLIG DOS FÖR 1 mg/mL

	1 kg	5 kg	10 kg	50 kg
0,1 mg/kg/tim	-	-	1 mL/tim	5 mL/tim
0,6 mg/kg/tim	-	-	6 mL/tim	30 mL/tim

REFERENS/LÄNK

Micromedex

Rekommendation (Grade 2C)

http://www.essentialvidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade

LOKAL LÄNK

Lokal instruktion, begränsad åtkomst

http://eped.sll.sjunet.org/eped_extra/lokalreferens.html#4478

EPED CENTRALT

Handläggare/apotekare: Anna Hardmeier 2018-05-24

ePedID: 4478

Fastställare/läkare: Synnöve Lindemalm 2018-05-25

Versionsnummer, major: 2

Lokal kontakt: www.eped.se/kontakt

Giltig fr o m: 2018-05-25

KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT



Alteplas intravenös inf 1 mg/mL

(Actilyse)

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

Actilyse (registrerad produkt)

10 mg, Pulver & vätska till inj/inf

HÅLLBAR: Förvaras vid högst 25 C. Ljuskänsligt. Förvaras i originalförpackningen.

1 mg/mL, Infusionsvätska, lösning

HÅLLBAR: 8 tim i rumstemp, 24 tim i kylskåp

20 mg, Pulver & vätska till inj/inf

HÅLLBAR: Förvaras vid högst 25 C. Ljuskänsligt. Förvaras i originalförpackningen.

50 mg, Pulver & vätska till inj/inf

HÅLLBAR: Förvaras vid högst 25 C. Ljuskänsligt. Förvaras i originalförpackningen.